

ЕГЭ

Под редакцией
И. В. Яценко

2020

19

Профильный

Г. И. Вольфсон
М. Я. Пратусевич
С. Е. Рукшин
К. М. Столбов
И. В. Яценко

**АРИФМЕТИКА
И АЛГЕБРА**

ФГОС

МАТЕМАТИКА

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ

Г. И. Вольфсон, М. Я. Пратусевич, С. Е. Рукшин,
К. М. Столбов, И. В. Яценко

ЕГЭ 2020. Математика

Арифметика и алгебра

Задача 19 (профильный уровень)

Под редакцией И. В. Яценко

Издание соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС)

Москва
Издательство МЦНМО
2020

УДК 373:51
ББК 22.1я72
В72

Авторы:

Г. И. Вольфсон, М. Я. Пратусевич, С. Е. Рукшин,
К. М. Столбов, И. В. Яценко

Вольфсон Г. И. и др.

В72 ЕГЭ 2020. Математика. Арифметика и алгебра. Задача 19
(профильный уровень) / Под ред. И. В. Яценко. — М.: МЦНМО,
2020. — 141 с.

ISBN 978-5-4439-1419-0

Пособия по математике серии «ЕГЭ 2020. Математика» ориентированы на подготовку учащихся старшей школы к успешной сдаче Единого государственного экзамена по математике. В данном учебном пособии представлен материал для подготовки к решению задачи 19.

Пособие предназначено для учащихся старшей школы, учителей математики, родителей.

Издание соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).

ББК 22.1я72



ISBN 978-5-4439-1419-0

© Вольфсон Г. И., Пратусевич М. Я.,
Рукшин С. Е., Столбов К. М.,
Яценко И. В., 2020.

© МЦНМО, 2020.

Предисловие

Одной из целей математического образования, нашедшей отражение в федеральном компоненте государственного стандарта по математике, является интеллектуальное развитие учащихся. Эта цель выходит на одно из ведущих мест при углублённом изучении математики.

Поскольку одним из основных отличий задачи 19 (в зависимости от состава задач на экзамене по математике в разные годы эта задача имела разные номера) от остальных задач ЕГЭ является её явно выраженный нестандартный характер, а сведения, необходимые для решения этой задачи, могут относиться к самым различным разделам школьного курса, построение решения может потребовать нетривиальных идей и методов, постольку смыслом включения задачи 19 в состав контрольно-измерительных материалов ЕГЭ является именно диагностика уровня интеллектуального развития учащихся.

Целью данной книги является не столько подготовить к решению задачи 19, сколько помочь учителю систематически заниматься интеллектуальным развитием учащихся на материале содержания задачи 19.

Авторы сборника старались дать обзор тех тем, которым в школе традиционно уделяется меньше внимания, и показать некоторые специфические методы решения задач. В сборник включены и более трудные задачи, примыкающие к так называемой «олимпиадной тематике». Эти задачи отмечены звёздочкой.

Материалы книги могут служить подспорьем в проведении элективных курсов, кружков и факультативов.

В заключение отметим, что, безусловно, перечень возможных сюжетов и тем задачи 19 не исчерпывается приведёнными в данной книге.

Авторы будут благодарны за конструктивную критику и замечания по содержанию этой книги, которые можно присылать по адресу sb@mccme.ru.

Диагностическая работа

1. На какие числа может быть сокращена дробь $\frac{2n+6}{3n+10}$, где n — натуральное число?
2. Дано натуральное число n . Его умножили на число m , полученное из n перестановкой цифр. Могло ли при этом получиться число 27812754?
3. Докажите, что число $21^{2012} + 439^{2011}$ делится на 440.
4. Докажите, что если к произвольному трёхзначному числу приписать справа его же, то полученное шестизначное число будет делиться на 13.
5. НОК двух натуральных чисел в 7 раз больше, чем их НОД. Во сколько раз сумма этих чисел больше, чем их НОД?
6. Найдите все четырёхзначные чётные числа, у которых ровно 22 делителя.
7. Решите уравнение в целых числах: $x^2 + 10xy - 5y = 3$.
8. Даны две группы натуральных чисел. В первой группе три числа, и их среднее арифметическое равно 8, а во второй — два числа, и их среднее арифметическое равно 13. Может ли произведение всех пяти данных чисел быть равным 100 000?
9. Решите уравнение в целых числах: $5^n + 12^n = 13^n$.
10. Какое наибольшее количество членов может быть в арифметической прогрессии, все члены которой — натуральные числа, если известно, что каждый следующий член этой прогрессии не менее чем в полтора раза больше предыдущего?

Решения задач диагностической работы

Как обычно, $a : b$ означает, что a делится на b .

1. Пусть эта дробь сократима на целое число d , большее 1. Тогда $(2n + 6) : d$ и $(3n + 10) : d$ (подробнее о свойствах делимости см. §1). Поэтому по свойствам делимости $2(3n + 10) - 3(2n + 6) : d$, т. е. $2 : d$. Следовательно, d может быть равно только 2. Осталось подобрать хотя бы одно значение n , при котором дробь сократима на 2. Для этого достаточно выбрать любое чётное значение n .

Ответ. 2 (при чётных n).

2. Заметим, что 27812754 делится на 27, но не делится на 81. Разберём два случая.

1) Число n делится на 9. Значит, сумма цифр числа n делится на 9. Тогда и m делится на 9, так как сумма цифр числа m совпадает с суммой цифр числа n : эти числа отличаются лишь перестановкой цифр, а сами цифры одни и те же. В этом случае произведение mn должно делиться на 81, а оно на 81 не делится.

2) Число n не делится на 9. Значит, сумма цифр числа n не делится на 9. Тогда и m не делится на 9, так как сумма цифр числа m совпадает с суммой цифр числа n . В этом случае произведение mn делится не более чем на вторую степень тройки, а оно должно делиться на 27.

В каждом из случаев пришли к противоречию, значит, число 27812754 получиться не могло.

Ответ. Нет.

3. *Решение 1.* 1) Рассмотрим первое слагаемое: $21^{2012} = 441^{1006}$. Так как $441 = 440 + 1$, то $441^{1006} = (440 + 1)^{1006} = 440 \cdot k + 1$.

2) Рассмотрим второе слагаемое: $439^{2011} = (440 - 1)^{2011} = 440 \cdot n - 1$.

3) Из п. 1, 2 получаем $21^{2012} + 439^{2011} = 440 \cdot k + 1 + 440 \cdot n - 1 = 440 \cdot (n + k)$, т. е. это выражение делится на 440, что и требовалось доказать.

Решение 2. 1) Рассмотрим первое слагаемое: $21^{2012} = 441^{1006}$. Так как $441 \equiv 1 \pmod{440}$, то $441^{2012} \equiv 1^{2012} \equiv 1 \pmod{440}$. Как обычно, $a \equiv b \pmod{p}$ означает « a и b имеют равные остатки при делении на p », или, что то же самое, $a - b : p$.

2) Рассмотрим второе слагаемое. Так как $439 \equiv -1 \pmod{440}$, то $439^{2011} \equiv (-1)^{2011} \equiv -1 \pmod{440}$.

3) Из п. 1, 2 получаем $21^{2012} + 439^{2011} \equiv 1 - 1 \equiv 0 \pmod{440}$, что и требовалось доказать.

4. Пусть данное трёхзначное число имеет вид \overline{abc} . Тогда после приписывания получится число \overline{abcabc} . Это число можно представить

в виде $1000\overline{abc} + \overline{abc} = 1001\overline{abc}$. Значит, это шестизначное число делится на 1001, а так как 1001 делится на 13, то и шестизначное число делится на 13, что и требовалось доказать.

5. Обозначим данные в условии задачи натуральные числа через x, y , а их НОД — через d . Тогда исходные числа можно представить в виде kd и nd , где $\text{НОД}(k, n) = 1$. В этом случае

$$\text{НОК}(x, y) = \frac{xy}{\text{НОД}(x, y)} = \frac{nd \cdot kd}{d} = knd.$$

Из условия следует, что $\text{НОК}(x, y) = 7 \cdot \text{НОД}(x, y)$, из чего с учётом введённых обозначений следует, что $knd = 7d$, $kn = 7$. Произведение двух натуральных чисел может быть равно 7 в том и только в том случае, если это числа 1 и 7, а значит, исходные числа равны d и $7d$. Тогда их сумма равна $8d$, т. е. она в 8 раз больше, чем их НОД.

Ответ. 8.

6. По формуле количества делителей числа (см. с. 32) можно представить 22 в виде произведения скобок вида $(k_i + 1)$, где k_i — натуральный показатель степени простого делителя, входящего в каноническое разложение исходного числа. Таких скобок может быть либо одна (само число 22), либо две (числа в них будут равны 2 и 11), а в виде произведения трёх и более натуральных чисел, больших 1, число 22 представить невозможно. Разберём эти два случая.

1) Пусть есть всего одна скобка. Значит, $k_1 + 1 = 22$, и тогда искомого числа имеет вид p^{21} , где p — простое число. Искомое число по условию чётно, следовательно, $p = 2$, но в числе 2^{21} больше 4 цифр. Следовательно, в этом случае решений нет.

2) Пусть произведение состоит из двух скобок, равных 2 и 11. Тогда в разложении искомого числа присутствуют ровно два простых числа, степени которых равны 1 и 10. Известно, что одним из простых сомножителей должно быть число 2, значит, искомого числа имеет вид $2 \cdot p^{10}$ или $2^{10} \cdot p$, где p — простое число, не равное 2. Первый случай не подходит, так как даже при наименьшем возможном значении p , равном 3, число $2 \cdot 3^{10}$ не является четырёхзначным. Во втором случае нужно отобрать все такие простые числа p , не равные 2, что $1024p$ — четырёхзначное число. Последовательно убеждаемся, что числа 3, 5 и 7 подходят, а 11 — уже нет.

Следовательно, искомые числа — $2^{10} \cdot 3$, $2^{10} \cdot 5$ и $2^{10} \cdot 7$, т. е. 3072, 5120 и 7168.

Ответ. 3072, 5120 и 7168.

7. Рассмотрим уравнение $x^2 + 10xy - 5y = 3$ и разберём три случая для переменной y .

1) Если число y отрицательно, то 5^y — нецелое число. Все остальные слагаемые в левой части целые, а значит, сумма целой быть не может. Поэтому в этом случае решений нет.

2) Если $y = 0$, то $x^2 = 4$, $x = \pm 2$.

3) Если число y положительно, то, перенося из левой части второе и третье слагаемые вправо, получаем $x^2 = 5^y - 10xy + 3$.

Заметим, что 5^y оканчивается на 5, $10xy$ — на 0, а значит, сумма в правой части равенства оканчивается на 8. Но тогда и x^2 должен оканчиваться на 8, а квадраты натуральных чисел на 8 не оканчиваются. Следовательно, в этом случае решений нет.

Ответ. $(-2; 0)$, $(2; 0)$.

8. Обозначим числа первой группы через a_1, a_2, a_3 , а числа второй группы — через a_4, a_5 . По условию $\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = 8$, а значит, $a_1 + a_2 + a_3 = 24$. Аналогично $\frac{a_4 + a_5}{2} = 13$, $a_4 + a_5 = 26$. По неравенству о средних

$$\sqrt[5]{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5} \leq \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}{5},$$

т. е.

$$\sqrt[5]{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5} \leq \frac{50}{5}, \quad a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \leq 100000.$$

Если же $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = 100000$, то в неравенстве о средних достигается равенство, что возможно только в том случае, когда $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = a_5$. Но тогда средние арифметические первого и второго наборов должны совпадать, что не соответствует условию задачи. Значит, произведение данных чисел не может быть равным 100000.

Ответ. Нет.

9. Заметим, что $n = 2$ — решение данного уравнения. При увеличении переменной на 1 правая часть уравнения увеличивается в 13 раз, а левая — менее чем в 12, так как $5^{n+1} + 12^{n+1} < 12(5^n + 12^n)$. Следовательно, при $n > 2$ решений нет.

Аналогично, если уменьшить значение переменной на 1, то правая часть уменьшится в 13 раз, а левая — менее чем в 12 раз. Следовательно, и при $n < 2$ решений нет.

Ответ. 2.

10. Докажем от противного, что в искомой прогрессии не более 3 членов. Пусть искомая прогрессия состоит хотя бы из четырёх членов и имеет вид a_1, a_2, \dots , а её разность равна d . Тогда $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$, $a_4 = a_1 + 3d$. Из условия следует, что $\frac{a_4}{a_3} \geq 1,5$, $a_4 \geq 1,5a_3$, или $a_1 + 3d \geq 1,5a_1 + 3d$, $0 \geq 0,5a_1$ — что противоречит тому, что a_1 — натуральное число.

Следовательно, в прогрессии не более трёх членов.

Осталось привести пример прогрессии, состоящей из трёх членов и удовлетворяющей условию задачи. Таким примером может служить прогрессия $\{1; 2; 3\}$.

Ответ. 3.

§ 1. Делимость и её свойства.

Признаки делимости

Диагностическая работа 1

1. Число $\overline{134*}$ кратно 3. Какую цифру можно поставить вместо звёздочки? (Перечислите все возможные варианты.)
2. Делится ли число 314567891 на 11?
3. Какую цифру нужно поставить вместо звёздочки, чтобы число $314159*6$ было кратно 8? (Перечислите все возможные варианты.)
4. В буфете купили несколько пирожных по 35 рублей и 14 порций кофе (каждая порция кофе стоит целое число рублей). Мог ли весь купленный товар стоить 501 рубль?
5. Сумма и произведение двух натуральных чисел кратны 136. Докажите, что квадрат каждого из них кратен 136.

Краткая теоретическая справка

В этом параграфе все числа целые, если не оговаривается противное.

Определение. Число a делится на число $b \neq 0$, если существует такое число c , что $a = bc$. В этом случае говорят, что b является делителем числа a .

Обозначение: $a : b$.

Свойства делимости

1. Если a делится на b , то для любого числа k число ka делится на b .
2. Если a делится на c и b делится на c , то сумма, разность и произведение чисел a и b делятся на c .
3. Если a делится на b и b делится на c , то a делится на c .
4. Если a делится на c и b делится на d , то ab делится на cd .

Признаки делимости для десятичной записи числа

Число делится на 2 тогда и только тогда, когда его последняя цифра чётна.

Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3. Более того, сумма цифр числа даёт такой же остаток от деления на 3, как и само число.

Число делится на 4 тогда и только тогда, когда две его последние цифры составляют число, которое делится на 4.

Число делится на 5 тогда и только тогда, когда оно оканчивается на 0 или 5.

Число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 9. Более того, сумма цифр числа даёт такой же остаток от деления на 9, как и само число.

Число делится на 11 тогда и только тогда, когда разность суммы цифр, стоящих на нечётных местах, и суммы цифр, стоящих на чётных местах, делится на 11 (например, число 305792608 делится на 11, так как $(8 + 6 + 9 + 5 + 3) - (0 + 2 + 7 + 0) = 22$ делится на 11).

Простые и взаимно простые числа

Определение. Натуральное число, отличное от 1, называется *простым*, если у него нет натуральных делителей, отличных от 1 и него самого. Числа, отличные от 1 и не являющиеся простыми, называются *составными*.

Важно! Единица не является ни простым, ни составным числом.

Определение. Два числа, наибольший общий делитель которых равен 1, называются *взаимно простыми*.

Если число a делится на числа b и c , причём числа b и c взаимно просты, то число a делится на их произведение bc . Данное утверждение верно не только для двух чисел, но и для любого количества попарно взаимно простых чисел (а именно: если число a делится на каждое из n чисел, причём любые два числа из данных n чисел взаимно просты, то число a делится на произведение данных n чисел).

1.1. Свойства делимости

Примеры решения задач

1. Найдите все такие $a \in \mathbb{N}$, что $\frac{2a+1}{a-2}$ — целое число.

Решение. Если число $\frac{2a+1}{a-2}$ целое, то это равносильно тому, что $(2a+1) : (a-2)$. Тогда и разность этих чисел тоже будет делиться на $a-2$, т. е. $((2a+1)-(a-2)) : (a-2)$, откуда $(a+3) : (a-2)$. Но и разность этих чисел тоже должна делиться на $a-2$: $((a+3)-(a-2)) : (a-2)$, т. е. $5 : (a-2)$. Значит, $a-2$ — делитель числа 5. Но у числа 5 не так много делителей — это 1, 5, -1, -5.

Переберём все случаи.

1) $a-2 = 1$. Тогда $a = 3$ и $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{6+1}{3-2} = 7 \in \mathbb{Z}$. Значение $a = 3$ подходит.

2) $a - 2 = -1$. Тогда $a = 1$ и $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{2+1}{1-2} = -3 \in \mathbb{Z}$. Значение $a = 1$ подходит.

3) $a - 2 = 5$. Тогда $a = 7$ и $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{14+1}{7-2} = 3 \in \mathbb{Z}$. Значение $a = 7$ подходит.

4) $a - 2 = -5$. Тогда $a = -3$ — не натуральное число. Этот случай не подходит.

Ответ. $\frac{2a+1}{a-2} \in \mathbb{Z}$ только при $a = 1, 3, 7$.

2. Найдите все такие $a \in \mathbb{Z}$, что $\frac{2a+1}{a-2}$ — натуральное число.

Решение. Рассуждаем вначале аналогично задаче 1. Разберём 4 случая.

1) $a - 2 = 1$. При $a = 3$ имеем $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{6+1}{3-2} = 7 \in \mathbb{N}$. Значит, $a = 3$ подходит.

2) $a - 2 = -1$. При $a = 1$ имеем $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{2+1}{1-2} = -3 \notin \mathbb{N}$. Значит, $a = 1$ не подходит.

3) $a - 2 = 5$. При $a = 7$ имеем $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{14+1}{7-2} = 3 \in \mathbb{N}$. Значит, $a = 7$ подходит.

4) $a - 2 = -5$. При $a = -3$ имеем $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{-6+1}{-3-2} = 1 \in \mathbb{N}$. Значит, $a = -3$ подходит.

Ответ. $\frac{2a+1}{a-2} \in \mathbb{N}$ только при $a = -3, 3, 7$.

3. Найдите все такие $a \in \mathbb{N}$, что $(a^2 + a - 1) : (a - 2)$.

Решение. Заметим, что число $a^2 + a - 6$ делится на $a - 2$, так как

$$a^2 + a - 6 = (a - 2)(a + 3).$$

Тогда если $(a^2 + a - 1) : (a - 2)$ и $(a^2 + a - 6) : (a - 2)$, то и

$$(a^2 + a - 1) - (a^2 + a - 6) : (a - 2), \quad \text{т. е. } 5 : (a - 2).$$

Как и в прошлых задачах, переберём все возможные значения $a - 2$ — делители 5.

1) $a - 2 = 1$. Тогда $a = 3$ и $a^2 + a - 1 = 9 + 3 - 1 = 11$, а $a - 2 = 1$, и мы получаем $11 : 1$, значит, $a = 3$ нам подходит.

2) $a - 2 = -1$. Тогда $a = 1$ и $a^2 + a - 1 = 1 + 1 - 1 = 1$, а $a - 2 = -1$, и мы получаем $1 : (-1)$, значит, $a = 1$ нам подходит.

3) $a - 2 = 5$. Тогда $a = 7$ и $a^2 + a - 1 = 49 + 7 - 1 = 55$, а $a - 2 = 5$, и мы получаем $55 : 5$, значит, $a = 7$ подходит.

4) $a - 2 = -5$. Тогда $a = -3$ и $a^2 + a - 1 = (-3)^2 + (-3) - 1 = 5$ делится на $a - 2 = -5$, т. е. $a = -3$ подходит.

Ответ. $a = -3, 1, 3, 7$.

4. Докажите, что произведение любых трёх последовательных чисел делится на 6.

Решение. Давайте заметим, что из трёх последовательных чисел хотя бы одно с гарантией будет чётным (так как чётные и нечётные числа чередуются и трёх подряд нечётных чисел не бывает). Также давайте заметим, что одно из трёх последовательных чисел делится на 3 (так как числа, делящиеся на 3, идут через два и они просто не могут «проскочить» наши три подряд идущих числа). Значит, в произведении любых трёх последовательных чисел есть число, кратное трём, и число, кратное 2, поэтому произведение делится на 6.

5. Натуральные числа m и n таковы, что и $m^3 + n$, и $m^3 + m$ делятся на $m^2 + n^2$. Найдите m и n .

Решение. Заметим, что если $(m^3 + m):(m^2 + n^2)$ и $(m^3 + n):(m^2 + n^2)$, то

$$((m^3 + n) - (m^3 + m)) : (m^2 + n^2),$$

т. е. $(n - m) : (m^2 + n^2)$. Будем считать, что $n \geq m$ (иначе будем рассматривать дальше $m - n$ вместо $n - m$). Отсюда либо $n - m \geq m^2 + n^2$, чего, очевидно, не бывает, либо $n - m = 0$, значит, $m = n$. Тогда можно считать, что нам дано следующее: $(m^3 + m) : 2m^2$. Заметим, что $m^3 : m^2$, значит, и m должно делиться на m^2 , а такое бывает только при $m = 1$.

Ответ. $m = n = 1$.

Подготовительные задачи

1. Верно ли, что если число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24?

2. Число a делится на 3. Может ли число $2a$ не делиться на 3?

3. Число a чётно. Верно ли, что $3a$ делится на 6?

4. Число $15a$ делится на 6. Верно ли, что a делится на 6?

5. Число $n + 1$ делится на 3. Докажите, что $4 + 7n$ также делится на 3.

6. Найдите все такие $a \in \mathbb{N}$, что $(a^2 + 1) : a$.

7. Найдите все такие $a \in \mathbb{N}$, что $(a + 1) : a^2$.

8. Найдите все такие $a \in \mathbb{N}$, что $(a^2 + 2a - 3) : a$.

9. Найдите все такие $a \in \mathbb{N}$, что $(a^2 + 3) : (a^2 - 2)$.

10. Докажите, что произведение любых пяти последовательных чисел делится на 30.

11. Придумайте 5 различных натуральных чисел, сумма которых делится на каждое из них.

Основные задачи

1. Докажите, что дробь $\frac{6n+7}{10n+12}$ несократима ни при каких натуральных n .

2. Докажите, что число $n^3 - n$ делится на 24 при любом нечётном n .
3. Докажите, что сумма n последовательных натуральных чисел является составным числом (т. е. имеет хотя бы один делитель, отличный от единицы и самого числа) при любом натуральном $n > 2$.
4. Произведение двух чисел, каждое из которых не делится нацело на 10, равно 1000. Найдите сумму этих чисел.
5. Число умножили на сумму его цифр и получили 2008. Найдите исходное число.

1.2. Признаки делимости

Примеры решения задач

1. На доске написано: $72*3*$. Замените звёздочки цифрами так, чтобы полученное число делилось на 45.

Решение. Пусть на доске написано такое число: $72x3y$, где x и y — некие цифры. Тогда если это число делится на 45, то оно делится на 5 и на 9.

1) Делимость на 9.

По признаку делимости на 9 сумма цифр числа должна делиться на 9: $(7 + 2 + x + 3 + y) : 9$, $(12 + x + y) : 9$.

2) Делимость на 5.

Последняя цифра нашего числа должна быть либо 0, либо 5, т. е. либо $y = 5$, либо $y = 0$.

Пусть $y = 0$. Тогда $(12 + x + 0) : 9$, т. е. $(12 + x) : 9$, значит, $x = 6$.

Пусть $y = 5$. Тогда $(12 + x + 5) : 9$, т. е. $(17 + x) : 9$, значит, $x = 1$.

Ответ. 72 135, 72 630.

2. Два числа отличаются перестановкой цифр. Может ли их разность быть равной 20072008?

Решение. У обоих исходных чисел совпадают остатки от деления на 9 (они совпадают с остатками сумм цифр этих чисел, а цифры этих чисел по условию одинаковы). Тогда разность этих чисел должна быть кратна 9, а число 20072008 не делится на 9.

3. Докажите, что для любого натурального n число $10^n - 1$ делится на 9.

Решение. Число $10^n - 1$ записывается как $9 \dots 9$ (n девяток). Поэтому оно кратно 9.

4. Докажите, что число $11 \dots 1$ (всего $2n$ единиц, $n > 1$) составное (т. е. имеет хотя бы один делитель, отличный от единицы и самого числа).

Решение. Это число делится на число, составленное из n единиц. Результатом деления является число вида $10\dots 01$ (количество нулей равно $n - 1$).

5. В ряд выписаны числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними знаки «+» и «-» так, чтобы значение полученного выражения было равно нулю?

Решение. Так как среди чисел от 1 до 10 имеется 5 нечётных, то сумма этих чисел, взятых с любыми знаками, окажется нечётной, т. е. не сможет быть равной 0.

Ответ. Нет.

6. Чтобы открыть сейф, нужно ввести код — семизначное число из двоек и троек. Известно, что в кодовом числе двоек больше, чем троек. Кроме того, известно, что кодовое число делится на 3 и на 4. Найдите код сейфа.

Решение. Давайте заметим, что раз число делится на 4, то число, образованное двумя его последними цифрами, тоже делится на 4 (это просто признак делимости на 4). Посмотрим, каким может быть это число:

- 1) 22 не делится на 4; 2) 23 не делится на 4;
3) 32 делится на 4; 4) 33 не делится на 4.

Значит, наш код заканчивается на 32. Теперь заметим, что вся сумма цифр должна делиться на 3, так как число делится на 3. Переберём все возможные варианты кода:

1) 7 двоек не может быть, так как последние цифры 32.

2) 6 двоек. Сумма цифр $12 + 3 = 15$ делится на 3, значит, код делится на 3. Положение цифр 3 известно, она предпоследняя. Код имеет вид 2222232.

3) 5 двоек. Сумма цифр $10 + 6 = 16$, что не делится на 3, значит, код не делится на 3.

4) 4 двойки. Сумма цифр $8 + 9 = 17$, что не делится на 3, значит, код не делится на 3.

5) Меньше 4 двоек быть не может, так как двоек больше, чем троек.

Ответ. 2222232.

7. Докажите, что число, состоящее из 100 нулей, 100 единиц и 100 двоек, не может быть квадратом натурального числа.

Решение. Посчитаем сумму цифр этого числа:

$$S = 100 \cdot 1 + 100 \cdot 0 + 100 \cdot 2 = 300.$$

Заметим, что S делится на 3, но не делится на 9. Но, как известно, если $a^2 : p$, где p — простое число, то $a^2 : p^2$. Значит, S не может быть квадратом, так как оно делится на 3 и не делится на 3^2 .

Подготовительные задачи

1. Какие из чисел 863, 362, 99 832 476 252, 2012, 79 255 делятся: а) на 3; б) на 4; в) на 5; г) на 6; д) на 8; е) на 9; ж) на 11?
2. Докажите, что из трёх целых чисел всегда можно найти два, сумма которых чётна.
3. Докажите, что если сумма двух натуральных чисел нечётна, то их произведение чётно.
4. Разность двух натуральных чисел умножили на их произведение. Могло ли при этом получиться число 14 765 817 541 782 545?
5. На доске написано $645 * 7235$. Замените звёздочку цифрой так, чтобы полученное число делилось на 9.
6. К числу 15 припишите слева и справа по одной цифре, чтобы полученное число делилось на 15.
7. К числу 10 припишите слева и справа по одной цифре, чтобы полученное число делилось на 72.
8. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 составляются всевозможные натуральные числа, в записи которых каждая из этих цифр присутствует ровно 1 раз. Докажите, что сумма всех таких чисел делится на 9.
9. Найдите наибольшее натуральное число, делящееся на 36, в записи которого участвуют все 10 цифр по одному разу.
10. Можно ли из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 составить шестизначное число, делящееся на 11?
11. В примере на умножение одинаковые цифры заменены одинаковыми буквами, разные — разными. Докажите, что не могла получиться запись $\overline{ab} \cdot \overline{cd} = \overline{eeff}$.

Основные задачи

1. Допишите к числу 523 три цифры справа так, чтобы полученное шестизначное число делилось на 7, 8 и 9.
2. Можно ли числа от 1 до 21 разбить на несколько групп, в каждой из которых наибольшее число равно сумме всех остальных чисел группы?
3. В числах МИХАЙЛО и ЛОМОНОСОВ каждая буква обозначает цифру (разным буквам соответствуют разные цифры, одинаковым — одинаковые). Известно, что произведения цифр у этих чисел равны. Могут ли оба числа быть нечётными?
4. Найдите наибольшее четырёхзначное число, все цифры которого различны и которое делится на 2, 5, 9 и 11.

5. В натуральном числе a переставили цифры и получили новое число b . Известно, что $a - b = 11\dots 1$ (число из n единиц). Найдите наименьшее возможное значение n .

6. Найдутся ли 11 натуральных чисел, делящихся на 11, в записи каждого из которых по одному разу использованы: а) все цифры от 0 до 9; б) все цифры от 0 до 8; в) все цифры от 0 до 5?

7. Используя все цифры от 1 до 9 по одному разу, составьте наибольшее девятизначное число, делящееся на 11.

8. Произведение натурального числа и числа, записанного теми же цифрами, но в обратном порядке, равно 2430. Чему может быть равно исходное число?

9. Можно ли выдать 25 рублей ровно десятью монетами достоинством в 1 или 5 рублей?

10. Последняя цифра квадрата натурального числа 6. Докажите, что его предпоследняя цифра нечётна.

11. Числа от 1 до 37 записали в строку так, что сумма любых первых нескольких чисел делится на следующее за ними число. Какое число стоит на третьем месте, если на первом месте стоит число 37, а на втором — 1?

§ 2. Остатки

Диагностическая работа 2

1. Разделите с остатком 2012 на 13.
2. Число a даёт при делении на 8 остаток 5. Число b при делении на 16 даёт остаток 11. Найдите остаток от деления $a + b$ на 8.
3. Найдите последнюю цифру числа 13^{2013} .
4. При делении числа 518 с остатком получилось неполное частное 172. Найдите все возможные значения делителя и остатка.
5. Найдите все натуральные значения n ($20 < n < 40$), для каждого из которых $n^3 - 3n^2 + 7$ кратно 5.

Краткая теоретическая справка

Определение. Пусть a и $b \neq 0$ — два целых числа. *Разделить число a на число b с остатком* — это значит найти такие числа q и r , что выполнены следующие условия:

$$1) a = bq + r; \quad 2) 0 \leq r < |b|.$$

При этом число q называется *неполным частным*, а число r — *остатком* от деления a на b . Число a именуется делимым, а число b — делителем.

Равенство 1 при соблюдении неравенства 2 называют записью деления с остатком. При этом говорят, что число a даёт при делении на b остаток r .

При делении на b может быть не более $|b|$ различных остатков, при этом числа $0, 1, \dots, |b| - 1$ как раз и дают ровно $|b|$ различных остатков.

Теорема (о делении с остатком). *Для любых целых чисел a и $b \neq 0$ можно поделить с остатком a на b , т. е. представить a в виде $a = bq + r$, где $q, r \in \mathbb{Z}$ и $0 \leq r < |b|$, причём такое представление единственно.*

Пример. Верное равенство $-2018 = 11 \cdot (-183) - 5$ не является записью деления с остатком -2018 на -11 , так как число -5 отрицательно и остатком быть не может по определению. Правильная запись этого деления с остатком такова: $-2018 = 11 \cdot (-184) + 6$.

Теорема. *Сумма (произведение) чисел a и b даёт тот же остаток при делении на число m , что и сумма (произведение) остатков чисел a и b при делении на число m .*

Примеры решения задач

1. Найдите остаток числа 2^{2012} при делении на 3.

Решение. Заметим, что

$$2^{2012} = (2^2)^{1006} = 4^{1006}.$$

Четыре в любой степени даёт остаток 1 при делении на 3. Это верно потому, что 4 даёт остаток 1 при делении на 3, а при перемножении чисел их остатки перемножаются. Тогда 4^k даёт такой же остаток, что и $1^k = 1$. Поэтому 2^{2012} даёт остаток 1 при делении на 3.

2. Докажите, что квадраты натуральных чисел не дают остатка 2 от деления на 3.

Решение. Пусть число a возводится в квадрат.

Разберём три случая.

1) Число a даёт остаток 1 при делении на 3. Тогда a^2 даёт остаток $1 \cdot 1 = 1$.

2) Число a даёт остаток 2 при делении на 3. Тогда a^2 даёт такой же остаток, что и $2 \cdot 2 = 4$, т. е. даёт остаток 1.

3) Число a делится на 3. Тогда и a^2 делится на 3.

Итак, квадраты натуральных чисел дают остатки 0 и 1 при делении на 3.

3. При каких натуральных n выражение $2^n - 1$ делится на 7?

Решение. Составим таблицу остатков при делении числа 2^n на 7:

n	1	2	3	4	5	6	7
остаток числа 2^n при делении на 7	2	4	1	2	4	1	2

Заметим, что далее остатки будут повторяться: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

Видно, что, когда n делится на 3, у чисел 2^n получаем остаток 1; когда n даёт остаток 1 при делении на 3, получаем остаток 2; когда n даёт остаток 2 при делении на 3 — остаток 4. Значит, $2^n - 1$ делится на 7, только когда n делится на 3.

4. Докажите, что число $a^3 + b^3 + 4$ не является точным кубом натурального числа.

Решение. Посмотрим на остатки кубов при делении на 9. Для этого составим таблицу остатков.

остаток числа x при делении на 9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
остаток числа x^3 при делении на 9	0	1	8	0	1	8	0	1	8

Кубы натуральных чисел дают остатки 0, 1, 8 при делении на 9. Сумма двух кубов натуральных чисел даёт остатки 0, 1, 2, 7, 8 при делении на 9. Сумма двух кубов, увеличенная на 4, даёт остатки 4, 5, 6, 2, 3 при делении на 9. Среди этих остатков нет ни 0, ни 1, ни 8. Значит, данная сумма не может быть точным кубом.

5. Докажите, что $n^5 + 4n$ делится на 5 при любом натуральном n .

Решение. Разложим $n^5 + 4n$ на множители: $n \cdot (n^4 + 4)$. Тогда при n , делящихся на 5, это выражение делится на 5.

Рассмотрим таблицу остатков числа n^4 при делении на 5 (кроме случая, когда n кратно 5).

остаток числа n при делении на 5	1	2	3	4
остаток числа n^2 при делении на 5	1	4	4	1
остаток числа n^4 при делении на 5	1	1	1	1

Заметим, что $n^4 + 4$ при делении на 5 будет во всех случаях давать такой же остаток, что и число $1 + 4 = 5$, т. е. будет делиться на 5. Значит, и всё выражение будет делиться на 5 при любом натуральном n .

6. Существует ли такое натуральное n , что $n^2 + n + 1$ делится на 2015?

Решение. Построим таблицу остатков числа $n^2 + n + 1$ при делении на 5.

остаток числа n при делении на 5	0	1	2	3	4
остаток числа $n^2 + n + 1$ при делении на 5	1	3	2	3	1

Итак, $n^2 + n + 1$ не может делиться на 5, а значит, оно не делится и на 2015.

7. Существует ли степень двойки, из которой перестановкой цифр можно получить другую степень двойки?

Ответ. Нет, не существует.

Решение. Два числа, отличающиеся лишь порядком цифр, дают одинаковые остатки при делении на 9. Выясним, какие остатки при делении на 9 могут давать числа вида 2^n ($n = 1, 2, 3, \dots$):

степень числа 2	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	...
остаток степени при делении на 9	2	4	8	7	5	1	2	...

Докажем, что последовательность остатков при делении на 9 степеней двойки 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, ... периодична с периодом 6. Действительно, $2^{n+6} - 2^n = 2^n \cdot 63$ делится на 9. Предположим, что две степени двойки отличаются только лишь порядком цифр, тогда они дают

одинаковый остаток при делении на 9 и отличаются не менее чем в $2^6 = 64$ раза, т. е. в них разное количество цифр. Противоречие.

Замечание. В этой задаче мы воспользовались тем фактом, что число даёт такой же остаток при делении на 9, как и его сумма цифр.

8. Докажите, что для любых натуральных a, b, c найдётся такое натуральное n , что $n^3 + an^2 + bn + c$ не является точным квадратом.

Решение. Обозначим $P(n) = n^3 + an^2 + bn + c$. Допустим, что значения $P(1), P(2), P(3), P(4)$ все являются полными квадратами. Тогда $P(3)$ и $P(1)$ являются полными квадратами одной чётности, следовательно, оба значения дают одинаковый остаток по модулю 4, значит, $P(3) - P(1) \equiv_4 0$, и аналогично $P(4) - P(2) \equiv_4 0$. С другой стороны,

$$P(1) \equiv_4 1 + a + b + c;$$

$$P(2) \equiv_4 8 + 4a + 2b + c \equiv_4 2b + c;$$

$$P(3) \equiv_4 27 + 9a + 3b + c \equiv_4 3 + a + 3b + c;$$

$$P(4) \equiv_4 4^3 + a \cdot 4^2 + b \cdot 4 + c \equiv_4 c.$$

Значит,

$$P(3) - P(1) \equiv_4 3 + a + 3b + c - (1 + a + b + c) \equiv_4 2b + 2,$$

$$P(4) - P(2) \equiv_4 c - (2b + c) \equiv_4 -2b \equiv_4 2b.$$

Получается, что числа $2b + 2$ и $2b$ одновременно делятся на 4, чего не может быть.

Подготовительные задачи

1. Найдите остаток числа 2012 при делении на число: а) 3; б) 4; в) 5; г) 7; д) 9.

2. Найдите остаток числа -12 при делении на число: а) 3; б) 4; в) 5; г) 7; д) 9.

3. Найдите остаток числа $2011 \cdot 2012 + 2013^2$ при делении на 7.

4. Найдите последнюю цифру числа: а) 2^{2012} ; б) 3^{2010} ;
в) $5^{239} + 9^{566} - 7^{366}$.

5. Докажите, что квадраты натуральных чисел не дают остатков 2 и 3 от деления на 4.

6. Докажите, что квадраты натуральных чисел не дают остатков 2 и 3 от деления на 5.

7. Докажите, что $n^3 + 2n$ делится на 3 при любом натуральном n .

8. Какие остатки могут давать кубы натуральных чисел при делении: а) на 7; б) на 9?

9. Докажите, что $n^3 + 2$ не делится на 9 ни при каком натуральном n .

10. Докажите, что число 1000...0005000...0001 (в каждой из двух групп — по 2012 нулей) не является кубом натурального числа.

11. Натуральные числа x, y, z таковы, что $x^2 + y^2 = z^2$. Докажите, что хотя бы одно из этих чисел делится: а) на 3; б) на 4; в) на 5.

12. Докажите, что $\frac{n^5}{5} + \frac{n^3}{3} + \frac{7n}{15}$ — целое число при любом натуральном n .

Основные задачи

1. Найдите четырёхзначное число, которое при делении на 131 даёт остаток 112, а при делении на 132 даёт остаток 98.

2. Докажите, что $2222^{5555} + 5555^{2222}$ делится на 7.

3. Докажите, что число $6n^3 + 3$ не является точной шестой степенью натурального числа.

4. Найдите наибольшее трёхзначное число, дающее при делении на 3 остаток 2, при делении на 4 — остаток 3, а при делении на 5 — остаток 4.

5*. Натуральные числа m и n таковы, что $m > n$ и m не делится на n . Также известно, что остаток от деления m на n совпадает с остатком от деления $m + n$ на $m - n$. Найдите отношение $m : n$.

6. Десятизначное число на 1 больше квадрата натурального числа. Докажите, что в этом числе есть одинаковые цифры.

7*. Докажите, что при любом натуральном n сумма цифр числа 1981^n не меньше 19.

8. Найдите последнюю цифру числа $1^2 + 2^2 + \dots + 99^2$.

9. Докажите, что $1^n + 2^n + \dots + (n - 1)^n$ делится на n при любом нечётном n .

10. Натуральные числа x, y, z таковы, что $x^2 + y^2 = z^2$. Докажите, что xyz делится на 60.

11. Сумма неполного частного и остатка, полученных при делении некоторого натурального числа на 100, равна сумме неполного частного и остатка, полученных при делении того же числа на 1995. Найдите наименьшее возможное значение делимого.

12. Сколько существует натуральных чисел n , не превосходящих 100 000, для которых число $2^n - n^2$ делится на 7?

13. Пусть a и b — натуральные числа. При делении $a^2 + b^2$ на $a + b$ получается неполное частное q и остаток r . Найдите все пары (a, b) , для которых $q^2 + r = 2012$.

14. Докажите, что среди чисел вида $2^n - 3$ существует бесконечно много чисел, делящихся на 5, и бесконечно много чисел, делящихся на 13, но не существует ни одного числа, делящегося на 65.

15. Докажите, что $7^{2n} - 5^{2n}$ делится на 24 при любом натуральном n .

16. Докажите, что если $2^n - 2$ делится на n , то $2^{2^n-1} - 2$ делится на $2^n - 1$.

17*. Докажите, что из любых $2n - 1$ целых чисел можно выбрать ровно n чисел так, что их сумма делится на n .

18*. Имеются семь карточек с цифрами от 1 до 7. Докажите, что ни одно семизначное число, составленное из этих карточек, не может делиться на другое.

§ 3. Десятичная запись числа

Диагностическая работа 3

1. Для нумерации страниц в учебнике понадобилось 534 цифры. Страницы нумеруются начиная с 1. Сколько страниц в учебнике?
2. Возраст человека в 1998 году оказался равным сумме цифр года его рождения. Сколько ему лет?
3. Десятичная запись некоторого числа оканчивается на 2. Если же эту цифру переставить на первое место, то число удвоится. Найдите это число.
4. Могут ли две последние цифры десятичной записи квадрата натурального числа быть нечётными?
5. Докажите, что четырёхзначное число не может увеличиться в 7 раз, если его первую цифру переставить в конец.

Краткая теоретическая справка

Определение. Десятичной записью натурального числа называется его представление в виде $a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$, где $a_k \neq 0$ и все числа a_0, a_1, \dots, a_k — целые, неотрицательные и не превосходящие 9.

Таким образом, числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 играют особую роль. Они служат для десятичной записи других чисел, поэтому называются десятичными цифрами.

При записи числа пропускают степени числа 10 и просто выписывают его цифры подряд.

Например, $2012 = 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$.

Десятичная запись натурального числа n содержит ровно k цифр, если и только если выполнено неравенство $10^{k-1} \leq n < 10^k$.

С помощью десятичной записи можно записать и нецелые числа, используя отрицательные степени числа 10. Полученную запись называют *десятичной дробью*. Слагаемые, содержащие отрицательные степени числа 10, отделяются в записи от остальных слагаемых десятичной запятой (или точкой).

Например, $123,405 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 0 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$.

Однако не все числа представимы в виде такой записи, включающей конечное число цифр.

Несократимая правильная дробь $\frac{m}{n}$ представляется в виде конечной десятичной дроби в том и только в том случае, когда её знаменатель n не делится на простые числа, отличные от 2 и 5.

Примеры решения задач

1. Докажите признаки делимости на 3 и на 9.

Решение. Пусть $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1}$ — десятичная запись данного числа. Имеем $10 \equiv 1 \pmod{3}$, поэтому

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} &\equiv a_n \cdot 10^{n-1} + a_{n-1} \cdot 10^{n-2} + \dots + a_2 \cdot 10^1 + a_1 \cdot 10^0 \equiv \\ &\equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1 \pmod{3}, \end{aligned}$$

значит, данное число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3.

Аналогично $10 \equiv 1 \pmod{9}$ и

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} &\equiv a_n \cdot 10^{n-1} + a_{n-1} \cdot 10^{n-2} + \dots + a_2 \cdot 10^1 + a_1 \cdot 10^0 \equiv \\ &\equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1 \pmod{9}. \end{aligned}$$

Значит, данное число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 9.

2. Докажите признаки делимости на 4 и на 8.

Решение. Пусть $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 a_1}$ — десятичная запись данного числа. Тогда

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 a_1} &\equiv \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3} \cdot 100 + \overline{a_2 a_1} \equiv \\ &\equiv \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3} \cdot 25 \cdot 4 + \overline{a_2 a_1} \equiv \overline{a_2 a_1} \pmod{4}. \end{aligned}$$

Мы получили, что

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 a_1} \equiv \overline{a_2 a_1} \pmod{4}.$$

Значит, данное число делится на 4 тогда и только тогда, когда две его последние цифры составляют число, делящееся на 4.

Аналогично

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 a_1} &\equiv \overline{a_n a_{n-1} \dots a_4} \cdot 1000 + \overline{a_3 a_2 a_1} \equiv \\ &\equiv \overline{a_n a_{n-1} \dots a_4} \cdot 125 \cdot 8 + \overline{a_3 a_2 a_1} \equiv \overline{a_3 a_2 a_1} \pmod{8}. \end{aligned}$$

Значит, данное число делится на 8 тогда и только тогда, когда три его последние цифры составляют число, делящееся на 8.

3. Цифры двузначного числа поменяли местами, после чего вычли полученное двузначное число из исходного. Докажите, что полученная разность делится на 9.

Решение. Представим числа в десятичной записи. Тогда

$$\overline{ab} - \overline{ba} = 10a + b - (10b + a) = 9(a - b) : 9.$$

4. Докажите, что десятичная запись числа 3^{20} содержит не более 10 цифр.

Решение. Ясно, что $3^{20} = 9^{10} < 10^{10}$. Так как 10^{10} — наименьшее натуральное число, имеющее в десятичной записи ровно одиннадцать цифр, число 3^{20} имеет в десятичной записи не более 10 цифр.

5. Пусть a, b, c, d — различные цифры. Докажите, что $\overline{cdcdcdcd}$ не делится на \overline{aabb} .

Решение. Число \overline{aabb} делится на 11, а $\overline{cdcdcdcd}$ для различных c и d — нет, поэтому $\overline{cdcdcdcd}$ не может делиться на \overline{aabb} .

6. Существует ли натуральное число, которое при зачёркивании первой слева цифры уменьшается ровно в 2011 раз?

Решение. Допустим, что такое число существует, и обозначим через $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1}$ его десятичную запись. Тогда

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} - 10^{n-1} a_n = \frac{\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1}}{2011}.$$

Домножим обе части равенства на 2011:

$$2011 \cdot \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} - 2011 \cdot 10^{n-1} a_n = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1},$$

$$2010 \cdot \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} = 2011 \cdot 10^{n-1} a_n,$$

$$201 \cdot \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} = 2011 \cdot 10^{n-2} a_n,$$

$$2011 \cdot 10^{n-2} a_n : 201.$$

Но $2011 \cdot 10^{n-2}$ взаимно просто с 201, следовательно, $a_n : 201$, а это невозможно, так как a_n — цифра от 1 до 9.

Мы пришли к противоречию, значит, такого числа не существует.

7. Найдите все натуральные числа, являющиеся степенью двойки, при зачёркивании первой цифры у которых получается число, также являющееся степенью двойки.

Решение. Пусть мы зачеркнули первую цифру у числа 2^n , состоящего из $k + 1$ цифр, и получили число 2^m . Тогда

$$10^k < 2^n < 10^{k+1}, \quad 10^{k-1} < 2^m < 10^k, \quad \text{откуда} \quad \frac{1}{10^k} < \frac{1}{2^m} < \frac{1}{10^{k-1}}.$$

Перемножив первое и третье неравенства, получим $1 < 2^{n-m} < 10^2$.

Из последнего неравенства следует, что $0 < n - m < 8$.

В то же время 2^n и 2^m заканчиваются на одну и ту же цифру, следовательно,

$$\begin{aligned}2^n - 2^m &: 10, \\2^m(2^{n-m} - 1) &: 10, \\2^{n-m} - 1 &\equiv 0 \pmod{5}, \\2^{n-m} &\equiv 1 \pmod{5}.\end{aligned}$$

При помощи таблицы остатков степеней двойки по модулю 5 легко понять, что

$$(n - m) : 4.$$

Сопоставляя это соотношение с полученным ранее неравенством, получаем, что

$$n - m = 4.$$

Обозначим через a первую цифру числа 2^n , которую мы зачеркнули. Тогда

$$\begin{aligned}2^n - a \cdot 10^k &= 2^{n-4}, \\2^{n-4}(2^4 - 1) &= a \cdot 10^k, \\2^{n-4} \cdot 3 \cdot 5 &= a \cdot 2^k 5^k.\end{aligned}$$

В левой части равенства всего одна пятёрка, следовательно, $k = 1$, значит, 2^n — двузначное число. Перебирая все двузначные степени двойки, находим два подходящих числа: 32 и 64.

Подготовительные задачи

1. Докажите, что остаток числа при делении на 9 совпадает с остатком суммы цифр этого числа при делении на 9.

2. Двузначное число умножили на произведение его цифр, в результате чего получилось трёхзначное число, состоящее из одинаковых цифр, совпадающих с последней цифрой исходного числа. Найдите исходное число.

3. Натуральные числа от 1 до 20 выписали в строчку подряд: 1234...181920. В полученном натуральном числе нужно вычеркнуть 10 цифр так, чтобы натуральное число, образованное оставшимися цифрами, было а) наибольшим; б) наименьшим. Как это сделать?

4. Натуральное число умножили на удвоенное произведение его цифр. Получилось 2016. Найдите исходное число.

5*. Найдите наименьшее натуральное число, которое увеличивается ровно в 5 раз от перестановки последней цифры на первое место.

6. Докажите, что степень двойки не может оканчиваться четырьмя одинаковыми цифрами.

7. Между цифрами двузначного числа, делящегося на 3, вставили цифру 0, а к полученному трёхзначному числу прибавили удвоенную цифру его сотен. Получилось число, в 9 раз большее первоначального. Найдите исходное число.

Основные задачи

1. В трёхзначном числе поменяли местами цифры, стоящие в разрядах единиц и сотен, после чего из исходного числа вычли полученное. Докажите, что такая разность делится на 99.

2. Докажите, что квадрат натурального числа, оканчивающегося на 5, оканчивается на 25.

3. Сложили шесть трёхзначных чисел, полученных всевозможными перестановками трёх различных цифр. Докажите, что полученная сумма делится на 37.

4. Найдите все двузначные числа, которые равны сумме своей цифры десятков и квадрата цифры, стоящей в разряде единиц.

5*. При каком наименьшем натуральном n в десятичной записи правильной дроби $\frac{m}{n}$ после запятой могут подряд встретиться цифры 501?

6. Существует ли 100-значное число без нулевых цифр, которое делится на сумму своих цифр?

7. Может ли произведение всех цифр натурального числа быть равно 2010?

8. Число \overline{abcde} делится на 41. Докажите, что число \overline{eabcd} также делится на 41.

9. Найдите все трёхзначные числа, для которых любое число, полученное перестановкой их цифр, делится на 7.

10. Найдите все двузначные числа, квадрат которых оканчивается теми же двумя цифрами, что и исходное число.

11. Найдите все трёхзначные числа, квадрат которых оканчивается теми же тремя цифрами, что и исходное число.

12. Сколько существует двузначных чисел, которые ровно в 9 раз больше суммы своих цифр? А сколько существует таких трёхзначных чисел?

13. В натуральном числе поменяли местами две соседние цифры и из полученного числа вычли исходное. Докажите, что полученная разность всегда делится на 9.

14. В натуральном числе поменяли местами две цифры, стоящие через одну, и из полученного числа вычли исходное. Докажите, что полученная разность всегда делится на 99.

15. На чём основан следующий способ возведения числа, оканчивающегося на 5, в квадрат: отбросьте цифру 5, умножьте полученное число на следующее за ним натуральное число, после чего к результату припишите справа 25 (например, для получения квадрата числа 115 нужно 11 умножить на 12 и к их произведению — числу 132 — приписать справа 25; получится 13225)?

16. Какое наибольшее значение может принимать частное от деления трёхзначного числа на сумму всех его цифр?

17. Найдите все такие четырёхзначные числа \overline{abcd} , что $\overline{abcd} + \overline{abc} + \overline{ab} + a = 2011$.

18. Из трёх различных цифр составили все возможные двузначные числа без повторений цифр в одном числе. Сумма полученных чисел оказалась равной 528. Найдите исходные цифры.

19*. Друг за другом подряд выписали десятичную запись чисел 2^{100} и 5^{100} . Сколько всего цифр выписали?

20*. При некотором натуральном n десятичная запись чисел 2^n и 5^n начинается с одной и той же цифры. Какая это может быть цифра?

21. Девятизначное число, в записи которого есть все цифры, кроме нуля, после некоторой перестановки цифр уменьшилось ровно в 8 раз. Найдите все такие числа.

22. При каком наименьшем натуральном n в десятичной записи дроби $\frac{1}{n}$ после запятой могут подряд встретиться цифры 142? А в десятичной записи правильной дроби $\frac{m}{n}$?

23. а) Сколько существует таких натуральных чисел n , меньших 100, что каждое из чисел $\frac{1}{n}$ и $\frac{1}{n+1}$ выражается конечной десятичной дробью? б) Найдите все такие натуральные n .

24. Докажите, что десятичная периодическая дробь является рациональным числом.

25. Существует ли степень двойки, из которой перестановкой цифр можно получить степень пятёрки?

26. У числа 2^{2012} нашли сумму его цифр, у результата снова нашли сумму цифр и так далее. В конце концов получилось однозначное число. Найдите его.

27. Пусть A — сумма цифр числа 4444^{4444} , B — сумма цифр числа A . Найдите сумму цифр числа B .

28. Вася не заметил знак умножения между двумя трёхзначными числами и записал шестизначное число, оказавшееся в 7 раз больше их произведения. Найдите исходные числа.

29. К натуральному числу справа последовательно приписали два двузначных числа. Полученное число оказалось равным кубу суммы трёх исходных чисел. Найдите эти числа.

30. Найдите все пары таких: а) четырёхзначных; б) пятизначных чисел x и y , что число, полученное путём приписывания десятичной записи числа y после числа x , делится на произведение $x \cdot y$.

31. Найдите наибольшее натуральное число, не оканчивающееся нулём, которое при вычёркивании одной (не первой) цифры уменьшается в целое число раз.

32. Найдите четырёхзначное число, которое ровно в 4 раза меньше числа, записанного теми же цифрами в обратном порядке.

33. Одно из двух двузначных натуральных чисел в два раза больше другого. Найдите все пары таких чисел, если цифры меньшего из чисел соответственно равны сумме и разности цифр большего из чисел.

34. Трёхзначное число \overline{abc} делится на 17, девятизначное число $\overline{a000b000c}$ делится на 37. Найдите a , b и c .

35. Найдите четырёхзначное число, являющееся точным квадратом, если известно, что его первые две цифры одинаковы и последние две цифры также одинаковы.

36. Двузначное число в сумме с числом, записанным теми же цифрами в обратном порядке, даёт точный квадрат. Найдите все такие числа.

37*. Пусть $a = \overline{m\overline{n}}$, $b = \overline{n\overline{m}}$. Найдите наименьшее значение величины $\left| \frac{a}{b} - 2 \right|$.

38. Найдите все такие пары натуральных чисел a и b , что если к десятичной записи числа a приписать справа десятичную запись числа b , то получится число, большее произведения чисел ab на 32.

39. Найдите все такие пары натуральных чисел a и b , что если к десятичной записи числа a справа приписать десятичную запись числа b^2 , то получится число, большее произведения ab в семь раз.

40. К трёхзначному натуральному числу a дописали его же, а к полученному числу прибавили 1 и получили точный квадрат. Найдите все такие числа.

§ 4. НОД и НОК. Основная теорема арифметики

Диагностическая работа 4

1. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 462 и 536.
2. На какое натуральное число, большее 1, можно сократить дробь $\frac{3n+7}{7n+2}$ при натуральных значениях n ?
3. Сумма двух натуральных чисел равна 240, а их наибольший общий делитель равен 30. Найдите эти числа.
4. Найдите наименьшее общее кратное чисел $2011!$ и $2009! + 2010!$.
5. Произведение двух чисел, каждое из которых не кратно 10, равно 1000. Найдите сумму этих чисел.

Краткая теоретическая справка

Определение. *Наибольшим общим делителем* нескольких целых чисел (не все из которых равны 0) называется наибольшее натуральное число, на которое делится каждое из этих чисел.

Можно дать равносильное определение.

Определение. *Наибольшим общим делителем* нескольких целых чисел (не все из которых равны 0) называется натуральный общий делитель этих чисел, кратный любому их общему делителю.

Примером натурального числа, на которое делится каждое из нескольких целых чисел, является число 1, поэтому множество общих делителей нескольких целых чисел непусто.

Обозначение: $\text{НОД}(a_1; \dots; a_n)$ или, если нет риска перепутать, просто $(a_1; \dots; a_n)$.

Например, $\text{НОД}(2; 4; 6; 8) = 2$.

Напомним (см. §1), что натуральные числа называются взаимно простыми (если их больше двух, то иногда говорят «взаимно простыми в совокупности»), если их наибольший общий делитель равен 1.

Свойства наибольшего общего делителя

(Все фигурирующие в свойствах числа предполагаются целыми.)

1. Наибольший общий делитель нескольких целых чисел равен наибольшему общему делителю их модулей.

2. Если $d = \text{НОД}(a; b)$, то существуют такие целые числа x и y , что выполнено равенство $d = ax + by$.

3. Если числа a , b , c и q связаны равенством $a = bq + c$, то $\text{НОД}(a; b) = \text{НОД}(b; c)$. В частности, $\text{НОД}(a; b) = \text{НОД}(a + b; b)$.

4. Частные от деления нескольких натуральных чисел на наибольший общий делитель этих чисел взаимно просты в совокупности.

Чтобы найти наибольший общий делитель двух натуральных чисел, применяют алгоритм Евклида. А именно: делят с остатком большее из чисел на меньшее, затем делят меньшее число с остатком на полученный остаток, а затем делят полученные остатки с остатком друг на друга до тех пор, пока остатки не поделятся нацело. Последний ненулевой остаток будет равен наибольшему общему делителю двух чисел.

Пример. Найдём $(2576; 154)$:

$$1) 2576 = 154 \cdot 16 + 112;$$

$$2) 154 = 112 \cdot 1 + 42;$$

$$3) 112 = 42 \cdot 2 + 28;$$

$$4) 42 = 28 \cdot 1 + 14.$$

Так как 28 кратно 14, получаем, что $(2576; 154) = 14$.

Определение. *Наименьшим общим кратным* нескольких ненулевых целых чисел называется наименьшее натуральное число, кратное каждому из этих чисел.

Для данных ненулевых целых чисел существует общее кратное (например, произведение этих чисел), поэтому множество общих кратных нескольких ненулевых целых чисел непусто.

Можно дать равносильное определение.

Определение. *Наименьшим общим кратным* нескольких натуральных чисел называется общее кратное этих чисел, на которое делятся все общие кратные этих чисел.

Обозначение: $\text{НОК}[a_1, \dots, a_k]$ или, если нет риска перепутать, просто $[a_1, \dots, a_k]$.

Теорема. *Справедливо равенство $(a; b) \cdot [a; b] = ab$.*

Основная теорема арифметики и количество делителей. *Каждое натуральное число $n > 1$ имеет единственное (с точностью до*

порядка множителей) разложение на простые множители

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$$

(p_1, p_2, \dots, p_n — попарно различные простые числа, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ — натуральные числа). Данная форма записи называется канонической формой записи числа n .

Количество натуральных делителей числа n , записанного в канонической форме, равно

$$(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_k + 1).$$

Сумма всех натуральных делителей числа n , записанного в канонической форме, равна

$$\frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdot \dots \cdot \frac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}.$$

4.1. НОД и НОК

Примеры решения задач

1. Найдите наименьшую дробь, при делении которой на каждую из дробей $\frac{14}{25}$ и $\frac{21}{40}$ получаются натуральные числа.

Решение. Пусть эта дробь $\frac{a}{b}$, причём пусть она несократима. Требуется, чтобы $\frac{25 \cdot a}{14 \cdot b}$ и $\frac{40 \cdot a}{21 \cdot b}$ были натуральными числами. Так как a и b взаимно просты, это значит, что $25 : b$, $a : 14$, $40 : b$, $a : 21$. Тогда минимальное a , удовлетворяющее этим условиям, — это 42, а максимальное b — это 5.

2. Докажите, что дробь $\frac{12n+1}{30n+2}$ несократима ни при каких натуральных n .

Решение. Нам достаточно доказать, что $12n+1$ взаимно просто с $30n+2$. Пусть это не так. Тогда пусть $(12n+1) : p$ и $(30n+2) : p$. Заметим, что тогда $(30n+2 - 2(12n+1)) : p$, т. е. $6n : p$. Это значит, что p — это либо делитель числа n , либо делитель числа 6. Заметим, что $12n+1$ взаимно просто и с 6, и с n , так как $12n : n$ и $12n : 6$, поэтому p не может быть делителем числа n или числа 6.

Значит, такого p не существует, следовательно, данная в условии дробь несократима.

3. Натуральные числа m и n взаимно просты. Какие значения может принимать НОД чисел $4m+3n$ и $6m+5n$?

Решение. Заметим, что

$$((6m+5n) - (4m+3n)) : \text{НОД}(6m+5n, 4m+3n),$$

т. е.

$$2(m+n) : \text{НОД}(6m+5n, 4m+3n).$$

Теперь заметим, что, так как m и n взаимно просты, $m+n$ взаимно просто с m , и с n . Далее, $6m+5n = 3 \cdot 2(m+n) - n$, значит, $6m+5n$ взаимно просто с $m+n$, так как $m+n$ взаимно просто с n . Аналогично $4m+3n$ взаимно просто с $m+n$. Значит, единственный возможный общий делитель чисел $6m+5n$ и $4m+3n$ — это 2. Следовательно, $\text{НОД}(6m+5n, 4m+3n)$ не может быть больше 2. Значение 2, конечно же, достигается, например, если $m=1$, а $n=2$.

4. Найдите все пары натуральных чисел, разность которых равна 66, а их НОК равно 360.

Решение. Имеем $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Пусть a и b — искомые числа. Заметим, что у этих чисел нет никаких простых делителей, кроме 2, 3 и 5, так как иначе их НОК на них бы тоже делилось. Пусть $a = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$, $b = 2^m \cdot 3^n \cdot 5^k$. Тогда

$$\text{НОК}(a, b) = 2^{\max(x, m)} \cdot 3^{\max(y, n)} \cdot 5^{\max(z, k)}.$$

Значит, нам необходимо лишь, чтобы выполнялось равенство

$$\max(x, m) = 3, \quad \max(y, n) = 2, \quad \max(z, k) = 1.$$

Так как разность чисел a и b делится на 3 и хотя бы одно из них делится на 3, то они оба делятся на 3. Аналогично оба числа делятся на 2, но только одно из них делится на 5, иначе 66 делилось бы на 5. Аналогично только одно из них может делиться на 4, значит, одно из них делится на 8, а другое только на 2. Пусть, например, a делится на 5. Тогда переберём все возможные a и b : a может быть равно 30, 120, 360, 90, а b может быть равно 6, 72, 18, 24. Простым перебором выясняем, что подходит только пара 90 и 24.

Можно было также сразу заметить что a — делитель числа 360, больший 66 (72, 90, 120, 180, 360), что упростит перебор вариантов.

Чтобы обойтись без перебора, можно сначала доказать (как в приведённом решении), что оба числа делятся на 6 и других общих делителей нет (если бы существовал ещё один общий делитель, то на него делилась бы разность чисел, т. е. он мог быть равен только 11, но 360 на 11 не делится). Значит, $\text{НОД}(a, b) = 6$, а тогда, так как произведение наименьшего общего кратного двух чисел на их наибольший общий делитель равно произведению этих чисел, получаем, что произведение чисел равно 2160, а затем решаем систему уравнений.

5. Найдите $\text{НОД}(2^{30} - 1, 2^{40} - 1)$.

Решение. Заметим, что разность двух чисел делится на их НОД. Тогда

$$2^{40} - 1 - (2^{30} - 1) : \text{НОД}(2^{40} - 1, 2^{30} - 1), \\ 2^{30}(2^{10} - 1) : \text{НОД}(2^{40} - 1, 2^{30} - 1).$$

Число 2^{30} , очевидно, взаимно просто с нашими числами (оба они нечётные), следовательно, $2^{10} - 1 : \text{НОД}(2^{40} - 1, 2^{30} - 1)$. Заметим, что НОД этих чисел тоже делится на $2^{10} - 1$, так как

$$2^{40} - 1 = (2^{20} - 1)(2^{20} + 1) = (2^{10} - 1)(2^{10} + 1)(2^{20} + 1) : 2^{10} - 1, \\ 2^{30} - 1 = (2^{10} - 1)(2^{20} + 2^{10} + 1) : 2^{10} - 1.$$

Значит, НОД этих чисел и есть в точности $2^{10} - 1 = 1023$.

6. Найдите наибольший общий делитель всех чисел вида $p^2 - 1$, где p — простое число, большее 3, но меньшее 2012.

Решение. Заметим, что $p^2 - 1$ делится на 3 при любом p , не делящемся на 3 (квадрат по модулю 3 даёт остаток $1 \cdot 1$ либо остаток $2 \cdot 2$, что по модулю 3 одно и то же). Значит, наши числа все будут делиться на 3. Заметим также, что они все будут делиться на 8, так как p^2 при делении на 8 может давать только остаток 1 (оно сравнимо либо с $1 \cdot 1$, либо с $3 \cdot 3$, либо с $5 \cdot 5$, либо с $7 \cdot 7$, что по модулю 8 одно и то же). Но заметим, что больше ни на что наш общий делитель делиться не может, так как $5^2 - 1 = 24 = 3 \cdot 8$, а общий делитель должен быть меньше либо равен каждому из чисел.

Значит, искомым общим делителем — это 24.

Подготовительные задачи

1. Найдите НОД чисел 72 и 24.
2. Найдите НОД чисел 2 и 1921.
3. Найдите НОД чисел 384 и 288.
4. Найдите НОД чисел 787878 и 787878787878.
5. Найдите НОК чисел 12 и 36.
6. Найдите НОК чисел 4 и 2011.
7. Найдите НОК чисел 120 и 200.
8. Сколько существует пар натуральных чисел, НОК которых равно 2000?
9. Найдите наименьшую дробь, при делении которой на каждую из дробей $\frac{35}{66}$, $\frac{28}{165}$ и $\frac{25}{231}$ получаются натуральные числа.
10. На какое число и при каких натуральных значениях n сократима дробь $\frac{3n+4}{2n+5}$?

11. Натуральные числа m и n взаимно просты. Какие значения может принимать НОД чисел $m + n$ и $m^2 - mn + n^2$?

12. Придумайте два различных натуральных числа, произведение которых делится на их сумму.

Основные задачи

1. Какие значения может принимать $\text{НОД}(x, x + 2)$, где x — натуральное число?

2. Известно, что $x, y \in \mathbb{N}$, $\text{НОД}(x, y) = 13$, $\text{НОК}(x, y) = 52$. Найдите x и y .

3. Найдите все пары натуральных чисел, сумма которых равна 288, а их НОД равен 36.

4. Найдите все пары натуральных чисел, сумма которых равна 667, а частное от деления их НОК на их НОД равно 120.

5. Все обыкновенные правильные и несократимые дроби, числители и знаменатели которых — двузначные числа, упорядочили по возрастанию. Между какими двумя последовательно расположенными дробями находится число $\frac{4}{7}$?

6. Среди обыкновенных дробей с положительными знаменателями, расположенных между числами $\frac{96}{35}$ и $\frac{97}{36}$, найдите такую, знаменатель которой минимален.

7. Какие значения может принимать $\text{НОД}(x, y)$, если известно, что при увеличении числа x на 6 НОД увеличивается в 4 раза?

8. Найдите НОД всех девятизначных чисел, в записи каждого из которых каждая из цифр 1, 2, ..., 9 встречается ровно по одному разу.

9. Найдите НОД чисел 11111111 (8 единиц) и 11...111 (2012 единиц).

10. На какое число и при каких натуральных n сократима дробь $\frac{n^2 - 1}{n^4 + n^3 - n^2 + n + 1}$?

11. Докажите, что дробь $\frac{n^5 + n^4 + 4n^3 + 3n^2 + 3n + 1}{n^4 + n^3 + 3n^2 + 2n + 1}$ несократима ни при каких натуральных n .

12. Чему равен НОД всех чисел $4^{n+2} + 5^{2n+1}$ при натуральных значениях n ?

13. При каком наименьшем натуральном n каждая из дробей $\frac{2}{n+3}$, $\frac{3}{n+4}$, ..., $\frac{32}{n+33}$ несократима?

14. Натуральные числа a, b и c таковы, что $\text{НОК}(a, b) = 60$, $\text{НОК}(a, c) = 270$. Найдите $\text{НОК}(b, c)$.

15. Найдите все натуральные числа, не представимые в виде суммы двух взаимно простых чисел, отличных от единицы.

16. На клетчатой бумаге нарисован прямоугольник размера $m \times n$, стороны которого идут по линиям сетки. Через какое количество узлов сетки проходит эта диагональ и на сколько частей она разбивается линиями сетки, если: а) m и n — взаимно простые натуральные числа, б) m и n — произвольные натуральные числа?

17. По окружности радиуса R катится колесо радиуса r ($R, r \in \mathbb{N}$). В колесо вбит гвоздь, который, ударяясь об окружность, оставляет на ней отметки. Сколько всего таких отметок оставит гвоздь? Сколько раз колесо прокатится по окружности, прежде чем гвоздь попадёт в уже отмеченную ранее точку?

18. Пусть n_1, n_2, \dots, n_{10} — различные натуральные числа, сумма которых равна 2013. Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель этих 10 чисел?

4.2. Основная теорема арифметики. Делители

Примеры решения задач

1. Найдите НОД и НОК чисел a и b , где $a = 2^8 \cdot 3^{10} \cdot 5 \cdot 7^2$, а $b = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7^3$.

Решение. НОК чисел — это произведение всех простых делителей обоих чисел, взятых в максимальной из степеней, в которых они встречаются в обоих числах. Тогда $\text{НОК}(a; b) = 2^8 \cdot 3^{10} \cdot 5 \cdot 7^3$. НОД чисел — это произведение всех простых делителей обоих чисел, взятых в минимальной из степеней, в которых они встречаются в обоих числах. Тогда $\text{НОД}(a; b) = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7^2$.

2. Докажите, что составное число n всегда имеет делитель, не больший \sqrt{n} .

Решение. От противного: пусть все делители числа n больше \sqrt{n} . Возьмём два таких делителя: a и $\frac{n}{a}$. И a , и $\frac{n}{a}$ будут больше \sqrt{n} . Тогда $n = \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} < a \cdot \frac{n}{a} = n$. Получается, что $n < n$. Но это противоречие, значит, наше предположение неверно, т. е. найдётся такой делитель числа n , что он не будет превосходить \sqrt{n} .

3. Докажите, что число является квадратом натурального числа тогда и только тогда, когда у него нечётное число делителей.

Решение 1. Все делители натурального числа n разбиваются на пары так, что произведение делителей каждой пары равно n . Таким образом, количество делителей данного натурального числа чётно, за исключением случая, когда в одной паре оба числа совпадают (оче-

видно, что больше одной такой пары быть не может). В этом случае число n равно произведению двух одинаковых делителей из этой пары, т. е. является точным квадратом.

Решение 2. Пусть число n записано в канонической форме:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}.$$

Ясно, что число n является точным квадратом тогда и только тогда, когда все показатели степеней α_i , в которых входят в разложение простые множители, чётны. (Если $n = m^2$ и $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$, то $n = p_1^{2\alpha_1} p_2^{2\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{2\alpha_k}$.) С другой стороны, количество делителей числа n равно $N = (\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_k + 1)$. Из этой формулы следует, что число делителей N нечётно тогда и только тогда, когда все числа $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ чётны, что и требовалось доказать.

4. Найдите все натуральные числа, последняя цифра которых 0 и которые имеют ровно 15 различных натуральных делителей.

Решение. Воспользуемся формулой о количестве делителей у числа a , если $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$. Количество делителей равно

$$(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_n + 1).$$

Тогда в нашем случае имеется такое равенство:

$$(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_n + 1) = 15.$$

Заметим, что каждая скобка в произведении не меньше двух, поэтому скобок может быть только две, причём одна из них равна 3, а другая 5. Тогда в разложении нашего числа имеются только два простых множителя, один во 2-й степени и один в 4-й степени. Заметим, что наше число делится на 10 (так как оно кончается на 0), а значит, делится на 2 и на 5. Это означает, что два простых множителя в нашем числе и есть двойка и пятёрка. Тогда число может быть только двух видов: $2^2 \cdot 5^4$ или $2^4 \cdot 5^2$.

Подготовительные задачи

1. Разложите на простые множители числа 111, 1111, 11111, 111111, 1111111.

2. Произведение двух натуральных чисел, каждое из которых не делится нацело на 10, равно 1000. Найдите их сумму.

3. Существует ли целое число, произведение цифр которого равно 2000? А 2010? А 2012?

4. Сколько двоек присутствует в разложении на простые множители числа: а) 5!; б) 20!; в) $n!$?

5. Докажите, что число является квадратом натурального числа тогда и только тогда, когда каждый его простой делитель входит в его разложение в чётной степени.

6. Докажите, что произведение первых n простых чисел не является полным квадратом.

7. Найдите количество натуральных делителей у числа: а) 10; б) 20; в) 500; г) 2000; д) 56^n .

8. Найдите сумму натуральных делителей у числа: а) 10; б) 20; в) 500; г) 2000.

Основные задачи

1. Множество A состоит из натуральных чисел. Количество чисел в A больше семи. Наименьшее общее кратное всех чисел из A равно 210. Для любых двух чисел из A их наибольший общий делитель больше единицы. Произведение всех чисел из A делится на 1920 и не является квадратом никакого целого числа. Найдите все числа, из которых состоит множество A .

2. Найдите наименьшее натуральное число n , для которого $1999!$ не делится на 34^n .

3. Докажите, что нечётное число, являющееся произведением n различных простых сомножителей, можно представить в виде разности квадратов двух натуральных чисел ровно 2^{n-1} различными способами.

4. Определите, на какую наибольшую натуральную степень числа 2007 делится $2007!$.

5. Найдите наименьшее натуральное число, половина которого — квадрат, треть — куб, а пятая часть — пятая степень.

6. Найдите все натуральные числа, которые делятся на 42 и имеют ровно 42 натуральных делителя.

§ 5. Уравнения в целых числах

Диагностическая работа 5

1. Решите в целых числах уравнение $(x - y)(y + 1) = 11$.
2. Найдите все пары натуральных чисел, сумма которых равна их удвоенному произведению.
3. Решите в натуральных числах уравнение $x! - 2 = y^2$.
4. Решите в целых числах уравнение $2^x + 7 = y^2$.
5. Решите в целых числах уравнение $y^4 = x^2 + x$.

Краткая теоретическая справка

В этом параграфе все числа целые, если не оговаривается противное.

Уравнение вида $f(x, y, \dots) = 0$, переменные в котором считаются целочисленными, называется *уравнением в целых числах* или *диофантовым уравнением*. Набор целочисленных значений переменных, при подстановке которых в уравнение получается верное равенство, называется *решением* диофантова уравнения.

Пример. Уравнение $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ — диофантово уравнение (если считать, что переменные могут принимать целочисленные значения). Набор $(3, 4, 5)$ — одно из его решений.

Уравнение вида

$$ax + by = c \quad (1)$$

называется *линейным диофантовым уравнением*. Очевидно, что такое уравнение имеет решения в целых числах только тогда, когда $c \div (a; b)$. Однако верно и обратное утверждение¹: если $c \div (a; b)$, то уравнение (1) имеет целочисленные решения. В этом случае можно разделить оба коэффициента и свободный член уравнения на $(a; b)$ и решать полученное более простое уравнение.

Если пара чисел (x_0, y_0) является решением такого уравнения, то все его решения можно получить по формулам

$$\begin{cases} x = x_0 + k \cdot \frac{b}{(a; b)}, \\ y = y_0 - k \cdot \frac{a}{(a; b)} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

¹ Напомним, что через $(a; b)$ иногда обозначают НОД($a; b$).

Обычно указанную пару решений находят подбором, подставляя вместо одной переменной остатки от деления на коэффициент при другой.

В решении уравнений в целых числах помогает разложение на множители одной из частей, особенно если в другой части оказывается целое число.

Зачастую для решения диофантовых уравнений требуются более тонкие рассуждения, связанные с делимостью, перебором остатков, оценками частей уравнения, тождественными преобразованиями и т. п.

Примеры решения задач

1. Решите в целых числах уравнение $xу + 2x + 3y = 7$.

Решение. Представим левую часть уравнения в виде $xу + 2x + 3y = (x + 3)(y + 2) - 6$, после чего уравнение приобретает вид

$$(x + 3)(y + 2) = 13.$$

Если x и y — целые числа, то множители $x + 3$ и $y + 2$ также должны быть целыми.

Число 13 раскладывается в произведение целых чисел четырьмя различными способами: $13 = 1 \cdot 13 = 13 \cdot 1 = (-1) \cdot (-13) = (-13) \cdot (-1)$. Поэтому все решения данного уравнения в целых числах получаются из систем

$$\begin{cases} x + 3 = 1, \\ y + 2 = 13, \end{cases} \quad \begin{cases} x + 3 = 13, \\ y + 2 = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} x + 3 = -1, \\ y + 2 = -13, \end{cases} \quad \begin{cases} x + 3 = -13, \\ y + 2 = -1. \end{cases}$$

Решая их, получаем ответ: $(-2, 11)$, $(10, -1)$, $(-4, -15)$, $(-16, -3)$.

2. Решите в целых числах уравнение $3x + 2y = 7$.

Решение. Подставим вместо x остатки от деления на коэффициент при y , т. е. на 2. Если подставить $x = 0$, значение y получается нецелым, а если подставить $x = 1$, то $y = 2$. Таким образом, найдено одно решение этого уравнения — пара $(1, 2)$, а значит, общие формулы для решений этого уравнения имеют вид

$$\begin{cases} x = 1 + 2k, \\ y = 2 - 3k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Геометрически решения уравнения (1) суть координаты целочисленных точек, через которые проходит прямая, задаваемая этим уравнением.

3. Решите в целых числах уравнение $x^2 + x + 1 = y^2$.

Решение. Рассмотрим уравнение $x^2 + x + 1 - y^2 = 0$ как квадратное относительно x . Тогда $x = \frac{-1 \pm \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$. Для того чтобы x было целым числом, необходимо, чтобы $4y^2 - 3$ было точным квадратом, а это верно только при $y = \pm 1$ ($4y^2 - 3 = z^2 \Leftrightarrow (2y - z)(2y + z) = 3 \Leftrightarrow y = 1, z = \pm 1$ или $y = -1, z = \pm 1$).

Ответ. $(-1, -1), (0, -1), (-1, 1), (0, 1)$.

4. Решите в натуральных числах уравнение $4^x + 3^y = 5^z$.

Решение. Рассмотрим остатки, получающиеся при делении обеих частей уравнения на 4. Правая часть при натуральных значениях z даёт остаток 1, а левая часть может давать остатки 1 при чётных значениях y и 3 при нечётных значениях y . Таким образом, только чётные значения y могут входить в решения данного уравнения. Пусть $y = 2k$, где k — натуральное число.

Рассмотрим остатки от деления обеих частей уравнения на 3. Выражение 4^x даёт при делении на 3 остаток 1, а 5^z при чётных значениях z даёт остаток 1, а при нечётных значениях z — остаток 2. Поэтому только чётные значения z могут входить в решения. Пусть $z = 2l$, где l — натуральное число.

Из исходного уравнения, перенося в правую часть 3^y и раскладывая по формуле разности квадратов, получаем $4^x = (5^l - 3^k)(5^l + 3^k)$.

Каждый из полученных множителей должен являться неотрицательной степенью числа 2, поскольку в разложении их произведения на простые множители присутствуют только двойки. Имеем

$$\begin{cases} 5^l + 3^k = 2^s, \\ 5^l - 3^k = 2^t, \end{cases} \quad \text{причём } s > t.$$

Сложив эти уравнения, получаем $2 \cdot 5^l = 2^t \cdot (2^{s-t} + 1)$. Поскольку в разложение левой части на простые множители 2 входит в степени 1, а в разложение правой части — в степени t (ибо $2^{s-t} + 1$ — нечётное число, а значит, в его разложении на простые множители нет двоек), получаем $t = 1$ и

$$5^l = 2^{s-1} + 1. \quad (*)$$

Имеем уравнение $5^l - 3^k = 2$ (это второе уравнение системы), из которого, перебрав остатки от деления обеих частей уравнения на 3, получаем, что l — нечётное число.

Перепишем уравнение $(*)$ в виде $2^{s-1} = 5^l - 1$, откуда при $l > 1$ получаем $2^{s-1} = (5 - 1)(5^{l-1} + 5^{l-2} + \dots + 1)$. Вторая скобка является суммой l нечётных слагаемых, т. е. нечётным числом, большим 1, которое

не может входить множителем в произведение, равное точной степени двойки. Значит, $l = 1$, а тогда и $k = 1$. Окончательным ответом является единственная тройка чисел $(2, 2, 2)$.

Замечание. Заметим, что если хотя бы одна из переменных принимает отрицательное значение, то равенство не может быть верным.

Пусть, например, $x < 0$. Тогда запишем число $4^x + 3^y$ в виде несократимой дроби и заметим, что знаменатель этой дроби делится на степень четвёрки. В то же время в правой части равенства стоит либо целое число, либо несократимая дробь со знаменателем, равным степени пятёрки. Таким образом, равенство не выполнено. Аналогично рассматривается случай $y < 0$.

Тем самым уравнение решено не только в натуральных, но и в целых числах.

5. Решите в натуральных числах уравнение $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ при $x \leq y \leq z$.

Решение. Наибольшая из дробей, т. е. $\frac{1}{x}$, не меньше $\frac{1}{3}$. Тогда $x = 2$ или $x = 3$. Подставляя в исходное уравнение, получаем два случая, разбираемых аналогично.

Ответ. $(3; 3; 3)$, $(2; 3; 6)$, $(2; 4; 4)$.

Подготовительные задачи

1. Найдите все пары натуральных чисел, разность квадратов которых равна 5.

2. Найдите три подряд идущих целых числа, сумма кубов которых равна кубу следующего за ними числа.

3. Докажите, что прямая $4x + 6y - 7 = 0$ не проходит через точки, обе координаты которых — целые числа.

4. Решите в целых числах уравнение $x + y = xy$.

5. Решите в целых числах уравнение $(x + y)(x - 2y) = 7$.

6. Решите в натуральных числах уравнение $x^2 y^2 + x^2 + y^2 = 1969$.

7. Решите в натуральных числах уравнение $x + \frac{1}{y + \frac{1}{z}} = \frac{7}{3}$.

8. Решите в натуральных числах уравнение $xy(x + y) = 120$.

9. Решите в целых числах уравнение $x^2 + 4xy + 13y^2 = 59$.

Основные задачи

1. Решите в натуральных числах уравнение $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{239}$.

2. Решите в натуральных числах уравнение $x + y = x^2 - xy + y^2$.

3. Решите в целых числах уравнение $x(x + 1) = 4y(y + 1)$.

4. Решите в натуральных числах уравнение $x^2 + 3x + 5 = y^2$.

5. Решите в целых числах уравнение $3x^2 + 1 = 5y$.
6. Решите в целых числах уравнение $3^x = 1 + y^2$.
7. Решите в натуральных числах уравнение $3^x + 55 = y^2$.
8. Решите в натуральных числах уравнение

$$3x^2 + 12xy + 10y^2 = 2012.$$

9. Решите в натуральных числах уравнение

$$4x^2 + 12xy + 7y^2 = 2009.$$

10. Решите в натуральных числах уравнение $x^2 + 9y^2 = 2011$.

11. Решите в натуральных числах уравнение

$$x^2 + 10xy - 5y^2 = 2012.$$

12. Решите в натуральных числах уравнение $2^x + 3^x + 4^x = y^2$.
13. Решите в натуральных числах уравнение $x^3 + 7y = y^3 + 7x$.
14. Решите в целых числах уравнение $2^x - 2^y = 2016$.
15. Решите в целых числах уравнение $1 + x + x^2 + x^3 = 2^y$.
16. Решите в натуральных числах уравнение $x! - 1 = y^2$.
17. Решите в натуральных числах уравнение $x! + 12 = y^2$.
18. Решите в целых числах уравнение $3^x + 7 = 2^y$.
19. Решите в натуральных числах уравнение $x^y = y^x$.

§ 6. Неравенства и оценки в задачах теории чисел

Диагностическая работа 6

1. Перед каждым из чисел 22, 23, ..., 26 и 50, 51, ..., 60 произвольным образом ставят знак плюс или минус, после чего к каждому из образовавшихся чисел первого набора прибавляют каждое из образовавшихся чисел второго набора, а затем все 55 полученных результатов складывают. Какую наименьшую по модулю сумму можно получить в итоге?

2. Докажите, что произведение всех цифр натурального числа не превосходит самого этого числа.

3. Произведение цифр некоторого натурального числа x равно $85x - 169186$ и является нечётным числом. Найдите x .

4. Квадрат некоторого положительного числа имеет вид $0,9\dots9\dots$, где количество девяток после запятой равно 2012. Докажите, что само число имеет вид $0,9\dots9\dots$, где количество девяток после запятой не меньше 2012.

5. Какое наименьшее значение принимает выражение $x + \frac{81}{x}$ при положительных x ?

Краткая теоретическая справка

При решении задач бывают полезными понятие среднего арифметического и неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом.

Определение. Средним арифметическим нескольких чисел называется сумма этих чисел, делённая на их количество.

Средним геометрическим положительных чисел a_1, \dots, a_k называется число $\sqrt[k]{a_1 \cdot \dots \cdot a_k}$.

Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом. Среднее арифметическое нескольких положительных чисел не меньше их среднего геометрического, т. е. $\frac{a_1 + \dots + a_k}{k} \geq \sqrt[k]{a_1 \cdot \dots \cdot a_k}$. Равенство достигается в том и только в том случае, когда все числа равны.

Достаточно часто встречаются задачи, где требуется найти наибольшее (или наименьшее) значение какой-либо величины. В этом случае решение с необходимостью содержит две части.

1. Доказательство того, что величина достигает приведённого в ответе значения (обычно это просто пример).

2. Доказательство того, что значение величины не может быть больше (соответственно меньше) указанного в ответе.

6.1. Среднее арифметическое. Неравенство о средних

Примеры решения задач

1. Докажите, что среднее арифметическое двух неравных чисел больше меньшего числа и меньше большего числа.

Решение. Пусть $a < b$. Тогда $\frac{a+b}{2} < \frac{b+b}{2} = b$ и $\frac{a+b}{2} > \frac{a+a}{2} = a$, что и требовалось доказать.

2. Какое наибольшее значение может принимать произведение двух положительных чисел, если их сумма равна 10?

Ответ. 25.

Решение. Обозначим данные числа a и b . По условию $a + b = 10$. Тогда по неравенству о средних $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} = 5$, откуда $ab \leq 25$. При $a = b = 5$ равенство достигается.

3. Произведение положительных чисел a_1, a_2, \dots, a_n равно 1. Докажите, что $(a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_n + 1) \geq 2^n$.

Решение. Применим неравенство о средних к каждой скобке: $\frac{1+a_i}{2} \geq \sqrt{1 \cdot a_i} \Leftrightarrow 1 + a_i \geq 2\sqrt{a_i}$. Получим $(1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n) \geq 2\sqrt{a_1} \cdot 2\sqrt{a_2} \cdot \dots \cdot 2\sqrt{a_n} = 2^n \sqrt{a_1 a_2 \dots a_n} = 2^n$, что и требовалось доказать.

4. Две команды КВН участвуют в игре из четырёх конкурсов. За каждый конкурс каждый из шести судей выставляет оценку — целое число от 1 до 5; компьютер находит среднее арифметическое оценок за конкурс и округляет его с точностью до десятых. Победитель определяется по сумме четырёх полученных компьютером значений. Может ли оказаться, что сумма всех оценок, выставленных судьями, у проигравшей команды больше, чем у выигравшей?

Ответ. Такое может случиться.

Решение. Пусть оценки судей для первой команды за каждый из первых трёх конкурсов — 3; 3; 3; 3; 4, за четвёртый — 3; 3; 4; 4; 4; 4, а для второй команды за все конкурсы — 3; 3; 3; 3; 4; 4. Значения, полученные компьютером для первой команды, — 3,2; 3,2; 3,2; 3,7. Зна-

чения, полученные для второй, — 3,3; 3,3; 3,3; 3,3. Первая команда победила со счётом 13,3 : 13,2. При этом сумма оценок, выставленных судьями первой команде, — 79, второй команде — 80.

5. В вершинах 100-угольника расставлены числа так, что каждое равно среднему арифметическому своих соседей. Докажите, что все они равны.

Решение. Рассмотрим наименьшее из всех чисел. Оно равно среднему арифметическому своих соседей, каждое из которых не меньше него, но такое может быть только в том случае, если соседние числа равны данному. Таким образом, соседние числа также наименьшие из всех чисел, а значит, и их соседи им равны. Продолжая это рассуждение, мы докажем, что все числа в вершинах 100-угольника равны.

Подготовительные задачи

1. Докажите, что для любых чисел x, y выполняется неравенство $\frac{x^2 + y^2}{2} \geq xy$.

2. Докажите, что для любого положительного числа a выполняется неравенство $a + \frac{1}{a} \geq 2$.

3. Докажите, что для любых неотрицательных чисел x, y, z, t выполняется неравенство $\frac{x + y + z + t}{4} \geq \sqrt[4]{xyzt}$.

4. Докажите, что для любых положительных чисел x, y выполняется неравенство $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x + y}$.

5. Докажите, что для любых неотрицательных чисел x, y, z выполняется неравенство $(x + y)(y + z)(z + x) \geq 8xyz$.

6. Докажите, что для любых неотрицательных чисел x, y, z выполняется неравенство $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} + \frac{z}{x} \geq 3$.

7. Известно, что произведение двух положительных чисел равно 16. Какое наименьшее значение может принимать их сумма?

8. Может ли среднее арифметическое 10 целых чисел равняться 566,23?

9. Средний рост шести друзей — 1,2 м. Рост самого низкого из них — 1,1 м. Каков средний рост остальных пяти?

10. Средний возраст одиннадцати игроков футбольной команды — 22 года. Во время матча один из игроков получил травму и ушёл с поля. Средний возраст оставшихся на поле игроков стал равен 21 году. Сколько лет футболисту, получившему травму?

11. В соревновании участвовали 50 стрелков. Первый выбил 60 очков; второй — 80; третий — среднее арифметическое очков первых

двух; четвёртый — среднее арифметическое очков первых трёх. Каждый следующий выбил среднее арифметическое очков всех предыдущих. Сколько очков выбил 42-й стрелок?

12. Произведение положительных чисел a_1, a_2, \dots, a_n равно 1. Докажите, что их сумма больше или равна n .

Основные задачи

1. Докажите, что для любых чисел x, y, z выполняется неравенство

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx.$$

2. Докажите, что для любых чисел x, y, z выполняется неравенство

$$x^4 + y^4 + z^4 \geq xyz(x + y + z).$$

3. Докажите, что для любого неотрицательного числа x выполняется неравенство $3x^3 + 4 \geq 6x^2$.

4. Среднее арифметическое десяти различных положительных целых чисел равняется 10. Чему может равняться наибольшее среди этих чисел?

5. На шахматной доске расставлены числа, причём число в каждой клетке равно среднему арифметическому чисел в соседних клетках (клетки называются соседними, если у них есть общая сторона, так, например, у угловой клетки есть две соседних клетки). Докажите, что все числа равны. Решите задачу, если известно, что числа: а) натуральные; б) целые.

6. Докажите, что если сумма двух положительных чисел фиксирована, то произведение тем больше, чем ближе друг к другу они расположены на координатной оси.

7. Средний рост пяти баскетболистов равен 195 см. Какое наибольшее количество из этих игроков может иметь рост ниже 191 см?

8. Найдите наибольшее натуральное число, каждая некрайняя цифра которого меньше среднего арифметического соседних с ней цифр.

9. На доске написано более 40, но не более 48 целых чисел. Среднее арифметическое этих чисел равно -3 . Среднее арифметическое всех положительных из них чисел равно 4, а среднее арифметическое всех отрицательных из них равно -8 .

а) Сколько чисел написано на доске?

б) Каких чисел больше: положительных или отрицательных?

в) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них?

6.2. Неравенства и оценки

Примеры решения задач

1. Что больше: 5^{44} или 4^{53} ?

Решение. Имеем $5^{44} < (5^3)^{15} < (2^7)^{15} < 2^{106} = 4^{53}$.

2. Докажите, что число 2^{30} состоит: а) менее чем из 11 цифр; б) более чем из 9 цифр.

Решение. Это следует из неравенств $10^{10} > 8^{10} = 2^{30} = (1024)^3 > (10^3)^3 = 10^9$.

Подготовительные задачи

1. Найдите все пары натуральных чисел, удовлетворяющих неравенству $x + y < 4$.

2. Найдите все пары целых чисел, удовлетворяющих неравенству $x^2 + y^2 < 2y + 3$.

3. Что больше: 2^{300} или 3^{200} ?

4. Что больше: 2^{40} или 3^{28} ?

5. Что больше: $2^{100} + 3^{100}$ или 4^{200} ?

6. Что больше: $1234567 \cdot 1234569$ или 1234568^2 ?

7. Что больше: $101!$ или 51^{101} ?

8. Докажите, что при любом натуральном $n > 2$ выполняется неравенство $n^2 > n + 1$.

9. Решите в целых числах неравенство $\sqrt{x^3 - 5x - 3} \leq 6 - x$.

10. Найдите наибольшее целое x , удовлетворяющее неравенству $3 \cdot 2^{x+1} + 2^x < 1$.

Основные задачи

1. Докажите, что число 26^{15} состоит менее чем из 24 цифр.

2. Сколько цифр в числе 2^{100} ?

3. Что больше: 31^{11} или 17^{14} ?

4. Найдите наибольшее из чисел: 5^{100} , 6^{91} , 7^{90} , 8^{85} .

5. Докажите, что $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{98} - \frac{1}{99} + \frac{1}{100} > \frac{1}{5}$.

6. Найдите все такие вещественные значения x , что наибольшее целое число, не превосходящее $\frac{2x+17}{10}$, равно $\frac{3x+41}{3}$.

7. Решите уравнение $2^{[x]} = 2x + 1$ ($[x]$ — наибольшее целое число, не превосходящее x . Например, $[2,3] = 2$, $[-2,3] = -2$).

8*. Найдите все натуральные числа n , удовлетворяющие неравенству

$$2008 [n\sqrt{1004^2 + 1}] \geq n [2008\sqrt{1004^2 + 1}].$$

9. Найдите все пары целых чисел, удовлетворяющих системе неравенств

$$\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 + 24x - 28y + 167 < 0, \\ x + 2y < \frac{15}{2}. \end{cases}$$

10. Мастер делает за 1 час целое число деталей, большее 5, а его ученик — на 2 детали меньше. Один мастер выполняет заказ за целое число часов, а два его ученика (работающих с одинаковой скоростью) — на час быстрее. Сколько деталей входит в заказ?

§ 7. Последовательности и прогрессии

Диагностическая работа 7

1. Чему равна сумма первых 20 членов арифметической прогрессии, если сумма членов этой прогрессии с номерами с девятого по двенадцатый равна 10?

2. Сумма четырёх первых членов арифметической прогрессии равна 56, а сумма четырёх последних — 112. Найдите количество её членов, если первый член равен 11.

3. Найдите сумму всех трёхзначных чисел, которые при делении на 9 дают в остатке 4.

4. Чему может равняться знаменатель непостоянной геометрической прогрессии, если первые её три члена являются первым, седьмым и пятнадцатым членами арифметической прогрессии?

5. Найдите трёхзначное число, если его цифры образуют геометрическую прогрессию, а цифры числа, которое меньше данного на 400, — арифметическую.

Краткая теоретическая справка

Арифметическая прогрессия

Определение. *Арифметическая прогрессия* — последовательность, заданная следующим образом: $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n + d$, где $n \in \mathbb{N}$. Число $d \in \mathbb{R}$ называется разностью арифметической прогрессии. (Говорят также, что несколько чисел образуют арифметическую прогрессию, если они являются последовательными членами некоторой последовательности — арифметической прогрессии.)

Формула n -го члена арифметической прогрессии: $a_n = a_1 + (n-1)d$.

Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n.$$

Геометрическая прогрессия

Определение. *Геометрическая прогрессия* — последовательность, заданная рекуррентно следующим образом: $b_1 = b \neq 0$, $b_{n+1} = b_n q$, где $n \in \mathbb{N}$. Число $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$, называется знаменателем геометрической прогрессии.

Формула n -го члена геометрической прогрессии: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$.

Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии (при $q \neq 1$): $S_n = b_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$.

Характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий

Последовательность является арифметической прогрессией тогда и только тогда, когда каждый её член начиная со второго равен среднему арифметическому соседних, т. е. для любого $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, выполняется равенство $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$.

В частности, три числа a , b и c образуют арифметическую прогрессию тогда и только тогда, когда $b = \frac{a+c}{2}$.

Три ненулевых числа a , b , c образуют геометрическую прогрессию (именно в таком порядке) тогда и только тогда, когда $b^2 = ac$.

Примеры решения задач

1. Найдите сумму первых 20 членов арифметической прогрессии, если $a_{10} + a_{11} = 4$.

Решение. Заметим, что $a_{10} + a_{11} = a_9 + a_{12} = a_8 + a_{13} = \dots = a_1 + a_{20}$, таким образом, $S_{20} = (a_{10} + a_{11}) \cdot 10 = 40$.

Можно было решить эту задачу и другим стандартным способом: выразив a_{10} и a_{11} через первый член прогрессии a_1 и разность d , получим, что $a_{10} + a_{11} = 2a_1 + 19d = 4$. В то же время по формуле суммы арифметической прогрессии $S_{20} = \frac{2a_1 + 19d}{2} \cdot 20 = 40$.

2. В арифметической прогрессии четвёртый член равен 1. При каком значении разности произведение второго и седьмого членов будет наибольшим?

Решение. Обозначим разность прогрессии через d . Тогда

$$a_2 \cdot a_7 = (a_4 - 2d)(a_4 + 3d) = (1 - 2d)(1 + 3d) = -6d^2 + d + 1.$$

Квадратичная функция $f(d) = -6d^2 + d + 1$ достигает наибольшего значения при $d = \frac{1}{12}$.

Ответ. $\frac{1}{12}$.

3. Том Сойер красил забор длиной 105 метров, причём день за днём длина выкрашенной за один день части забора уменьшалась на одну и ту же величину. За сколько дней был покрашен забор, если за первые три дня Том выкрасил 36 метров забора, а за последние три — только 27 метров?

Решение. Пусть Тому понадобилось на покраску n дней и в день с номером k он покрасил a_k метров забора. По условию числа a_k образуют (убывающую) арифметическую прогрессию.

Заметим, что $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2}$, а по условию

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n = 36 + 27 = 63.$$

Отсюда следует, что $a_1 + a_n = 21$. По формуле суммы членов арифметической прогрессии $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = 105$, откуда $n = 10$.

Ответ. 10.

4. Могут ли числа 2, 3 и 17 быть членами (не обязательно последовательными) одной геометрической прогрессии?

Решение. Если бы такая прогрессия существовала, то имели бы место равенства $3 = 2 \cdot q^n$ и $17 = 3 \cdot q^k$ при некоторых $k, n \in \mathbb{N}$, а значит, $\left(\frac{3}{2}\right)^k = \left(\frac{17}{3}\right)^n \Leftrightarrow 3^{k+n} = 2^k \cdot 17^n$, что невозможно (хотя бы потому, что левая часть — нечётное число, а правая — чётное).

5. Дана арифметическая прогрессия с первым членом 1 и разностью 2. Докажите, что число

$$\frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{40}} + \sqrt{a_{41}}}$$

является целым.

Решение. Имеем

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{40}} + \sqrt{a_{41}}} = \\ & = \frac{\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}}{a_2 - a_1} + \frac{\sqrt{a_3} - \sqrt{a_2}}{a_3 - a_2} + \dots + \frac{\sqrt{a_{41}} - \sqrt{a_{40}}}{a_{41} - a_{40}} = \\ & = \frac{\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}}{d} + \frac{\sqrt{a_3} - \sqrt{a_2}}{d} + \dots + \frac{\sqrt{a_{41}} - \sqrt{a_{40}}}{d} = \\ & = \frac{\sqrt{a_{41}} - \sqrt{a_1}}{d} = \frac{\sqrt{81} - \sqrt{1}}{2} = 4. \end{aligned}$$

6. Найдите наибольшую разность арифметической прогрессии, среди членов которой есть числа $\frac{1}{17}$, $\frac{1}{15}$ и $\frac{1}{13}$.

Решение. Обозначим разность арифметической прогрессии через d . По условию для некоторых чисел $n, k \in \mathbb{N}$ имеют место равенства

$$\frac{1}{15} - \frac{1}{17} = \frac{2}{17 \cdot 15} = dn \quad \text{и} \quad \frac{1}{13} - \frac{1}{15} = \frac{2}{13 \cdot 15} = dk,$$

следовательно,

$$\frac{n}{k} = \frac{13}{17} \quad \text{и} \quad d = \frac{2}{15 \cdot 17 \cdot n}.$$

Из последнего равенства следует, что значение d будет наибольшим при наименьшем значении n , а из первого равенства следует, что наименьшим значением n является 13 (ибо n делится на 13). Следовательно, наибольшее значение — $d = \frac{2}{13 \cdot 15 \cdot 17}$. Нетрудно заметить, что при этом данные числа действительно будут являться членами арифметической прогрессии с этой разностью и $a_1 = \frac{1}{17}$.

7. Два положительных неравных числа являются первым и третьим членами некоторой арифметической прогрессии, и они же являются первым и третьим членами некоторой геометрической прогрессии. У какой из этих прогрессий сумма первых трёх членов больше?

Ответ. У арифметической.

Решение. Обозначим данные числа a и b . По характеристическим свойствам прогрессий второй член арифметической прогрессии равен $\frac{a+b}{2}$, а второй член геометрической прогрессии равен \sqrt{ab} . По неравенству между средним арифметическим и средним геометрическим (см. теоретическую справку в § 6) $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$, если $a \neq b$. Отсюда следует (ведь первый и третий члены прогрессий совпадают), что сумма членов арифметической прогрессии больше.

8. Различные числа a, b и c (в указанном порядке) образуют геометрическую прогрессию, а числа $\frac{1}{a+1}, \frac{1}{b+1}, \frac{1}{c+1}$ (в том же порядке) — арифметическую. Найдите сумму членов арифметической прогрессии.

Решение. По характеристическому свойству арифметической прогрессии верно равенство

$$\frac{1}{b+1} - \frac{1}{a+1} = \frac{1}{c+1} - \frac{1}{b+1} \Leftrightarrow \frac{a-b}{a+1} = \frac{b-c}{c+1}.$$

Обозначим знаменатель данной в условии геометрической прогрессии через q и подставим в это равенство числа $a = \frac{b}{q}$ и $c = bq$. Получим

$$\begin{aligned} \frac{b - \frac{b}{q}}{\frac{b}{q} + 1} = \frac{qb - b}{qb + 1} &\Leftrightarrow b \left(1 - \frac{1}{q}\right) (qb + 1) = b(q - 1) \left(\frac{b}{q} + 1\right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{b(q - 1)(qb + 1)}{q} = \frac{b(q - 1)(b + q)}{q}, \end{aligned}$$

откуда с учётом неравенств $q \neq 1$ и $b \neq 0$ следует, что $qb + 1 = b + q \Leftrightarrow (q - 1) \cdot (b - 1) = 0$, а значит, $b = 1$ и искомая сумма арифметической прогрессии равна $S = \frac{3}{b+1} = \frac{3}{2}$.

9. Шесть простых чисел являются последовательными членами возрастающей арифметической прогрессии. Докажите, что разность этой прогрессии не менее 30.

Решение. Предположим, что разность прогрессии нечётна. Тогда в этой прогрессии будет как минимум три чётных числа, что невозможно. Аналогично если разность прогрессии не кратна 3, то в эту прогрессию входят как минимум два числа, кратные трём. Значит, разность прогрессии кратна 2 и 3, т. е. кратна 6.

Если разность прогрессии не кратна 5, то в ней есть член, кратный 5. Тогда это просто число 5. Если 5 — первый член прогрессии, то среди оставшихся 5 членов есть ещё один член, кратный 5, что невозможно. Если же 5 не является первым членом, то первый член будет отрицательным, ибо ранее доказано, что разность прогрессии не меньше 6.

Итак, разность прогрессии кратна 5 и 6, т. е. кратна 30, а значит, не менее 30.

Интересно, что прогрессия 7, 37, 67, 97, 127, 157 состоит из простых чисел.

Подготовительные задачи

1. Дана арифметическая прогрессия с первым членом 2 и разностью -3 . Найдите десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти её членов.

2. Второй член арифметической прогрессии равен 5. Найдите сумму первых трёх членов прогрессии.

3. В арифметической прогрессии $a_{20} = 30$ и $a_{30} = 20$. Найдите a_{50} .

4. Сумма первых десяти членов геометрической прогрессии равна 1023, а первый член равен 1. Найдите знаменатель прогрессии.

5. Третий член геометрической прогрессии равен 4. Найдите произведение первых пяти членов прогрессии.

6. Найдите шестой и десятый члены возрастающей геометрической прогрессии, если их сумма равна 16, а произведение четырнадцатого и второго членов этой прогрессии равно 60.

7. Сумма пятого и девятого членов геометрической прогрессии равна 7. Найдите сумму их квадратов, если произведение шестого и восьмого членов этой прогрессии равно 12.

8. Найдите наибольшую из сумм первых n членов арифметической прогрессии, если $a_1 = 78$, $a_2 = 70$.

9. Сумма трёх чисел, образующих арифметическую прогрессию, равна 12. Найдите наибольшее значение произведения этих чисел.

10. Могут ли цифры простого трёхзначного числа образовывать арифметическую прогрессию?

Основные задачи

1. Каждое из чисел 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 умножают на каждое из чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8 и перед каждым из полученных произведений произвольным образом ставят плюс или минус, после чего все 54 полученных результата складывают. Какую наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге?

2. Могут ли числа 1 , $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ быть членами (не обязательно последовательными) одной арифметической прогрессии?

3. В арифметической прогрессии $a_1 = -85$, a_{19} — её первый положительный член. Какие значения может принимать разность прогрессии?

4. В арифметической прогрессии пятый член равен 2. При каком значении разности прогрессии сумма всевозможных попарных произведений четвёртого, седьмого и восьмого членов прогрессии будет наименьшей?

5. Найдите всевозможные значения a , при которых числа $2\sqrt{2a}$, -8 , $3\sqrt{8a}$ являются, в некотором порядке, последовательными членами арифметической прогрессии.

6. Отношение суммы первых трёх членов возрастающей арифметической прогрессии к сумме её последующих семи членов равно $7:3$. Найдите разность прогрессии, если известно, что у неё имеются два соседних члена, произведение которых равно $-\frac{7}{4}$.

7. Сумма модулей членов конечной арифметической прогрессии равна 100. Если все её члены увеличить на 1, то сумма модулей членов полученной прогрессии будет также равна 100. Какие значения при этих условиях может принимать величина n^2d , где d — разность прогрессии, а n — число её членов?

8. Обозначим через S_n сумму первых n членов непостоянной арифметической прогрессии. Найдите все прогрессии, для которых при всех $n, k \in \mathbb{N}$ выполняется равенство $S_n \cdot S_k = S_{nk}$.

9. Докажите, что существуют арифметические прогрессии произвольной длины, состоящие из попарно взаимно простых чисел.

10. Три числа, сумма которых равна 12, образуют арифметическую прогрессию. Если второе число оставить без изменения, а первое и третье увеличить на 1, то получится геометрическая прогрессия. Найдите эти числа.

11. Геометрическая прогрессия с отрицательной суммой состоит из четырёх членов. Выбросив из неё второй член, мы получим возрастающую арифметическую прогрессию. Найдите знаменатель исходной геометрической прогрессии.

12. Три положительных числа образуют возрастающую арифметическую прогрессию. Если среднее из них уменьшить на 40%, то получится геометрическая прогрессия, сумма которой равна 39. Найдите эти числа.

13. Найдите все состоящие не менее чем из трёх простых чисел арифметические прогрессии с разностью 10.

14. Найдите все возрастающие конечные арифметические прогрессии, которые состоят из простых чисел и у которых количество членов больше, чем разность прогрессии.

15. Докажите, что последовательность, сумма n первых членов которой задаётся формулой $S_n = 3^n - 1$, является геометрической прогрессией.

16. Известно, что первый, десятый и сотый члены геометрической прогрессии являются натуральными числами. Верно ли, что 99-й член этой прогрессии также является натуральным числом?

17. Садовник, привив черенок редкого растения, оставляет его расти два года, а затем ежегодно берет от него 6 черенков. Сколько растений у него будет привито через 12 лет, если сначала он имел один черенок?

18. Сумма шестнадцати чисел равна 0,5. Известно, что сумма любых 15 из них положительна. Какое наименьшее целое значение может принимать наименьшее из этих чисел?

19. Все члены последовательности являются натуральными числами. Каждый член этой последовательности начиная со второго либо в 11 раз больше, либо в 11 раз меньше предыдущего. Сумма всех членов последовательности равна 2231.

а) Может ли последовательность состоять из 2 членов?

б) Может ли последовательность состоять из 3 членов?

в) Какое наибольшее количество членов может быть в последовательности?

20. Можно ли привести пример пяти различных натуральных чисел, произведение которых равно 1008 и

а) пять; б) четыре; в) три

из них образуют геометрическую прогрессию?

§ 8. Как решать задачу 19: задачи ЕГЭ прошлых лет

Сразу спешим огорчить: после прочтения этого параграфа задачи 19 не начнут решаться как по мановению волшебной палочки. Однако здесь мы изложим некоторые базовые принципы, которые пригодятся практически в любой задаче 19, а также разберём действие этих принципов на примерах реальных задач Единого государственного экзамена прошлых лет.

Во-первых, нужно научиться внимательно читать условие! Этот принцип, разумеется, полезен не только в задачах 19. Невнимательное прочтение условия влечёт за собой решение совсем другой задачи, возможно, с точки зрения математика не менее интересной, а порой даже гораздо более сложной, чем та, что предложена на экзамене. Проблема в том, что решить всё-таки надо именно приведённую в тексте экзамена задачу, так что все попытки решить что-то другое выльются исключительно в ноль баллов за эту задачу. А целью всё-таки является получение натурального числа в графе «баллы за № 19». Так что читайте условие внимательно, и лучше не один раз.

Также очень полезно проиллюстрировать условие каким-нибудь примером. Просто для лучшего понимания условия задачи. Вы должны чётко понимать, о чём именно идёт речь в задаче, осознать ту конструкцию, которая в ней описана, после чего решать задачу станет намного легче. Порой даже случается, что, придумывая пример, облегчающий понимание условия, вы, сами того не подозревая, уже решили один из трёх пунктов. Впрочем, что же это мы — говорим о примерах, а сами их не приводим? Вперёд! Отметим лишь, что большинству примеров будет предшествовать некоторое «обсуждение», то есть попытки прийти к решению, а лишь затем — уже собственно решение.

Пример 1. Существуют ли два натуральных числа, у которых разность между кубом их суммы и суммой их квадратов чётна?

Обсуждение. Сначала постараемся понять, чего же от нас хотят? Вопрос задачи — «существуют ли»: какие вообще варианты ответа есть на этот вопрос? Очевидно, или «Да, существуют», или «Нет, не существуют». Что мы должны сделать, если правильный ответ — «Да, существуют»? А просто привести конкретный пример, мол, вот вам два числа, для них условие выполняется, значит, такие числа существуют. Ведь если вам, скажем, задали такой вопрос: «Существуют ли

страны, название которых состоит из двух слов?» — достаточно было бы ответить — да, например, «Российская Федерация». Или «Новая Зеландия», к примеру, — любой подходящий пример будет ответом на данный вопрос.

А если правильный ответ — «Нет, не существуют», что нужно тогда? А в этом случае одного примера будет мало. Действительно, если мы приведём пару чисел и скажем, что для них условие не выполнено, разве из этого следует, что ни для какой пары условие не будет выполнено? Продолжая аналогию со странами, разве правильно было бы на вопрос «Существуют ли страны, название которых состоит из двух слов?» отвечать «Нет, например, у Франции одно слово в названии»? Конечно, это неверный ответ на поставленный вопрос. Так и нам при доказательстве ответа «Нет» в этой задаче мало просто привести пример, для которого условие не выполняется.

Теперь, когда мы более-менее разобрались, какого типа ответы бывают на поставленный вопрос, давайте попробуем проиллюстрировать задачу каким-нибудь примером. Возьмём любые два натуральных числа — скажем, 1 и 2. Кстати, а можно было бы взять 1 и 1? Да, ведь в условии не сказано, что числа различные, а что не запрещено, то разрешено!

Итак, подставляем 1 и 2. Внимательно, читаем условие. «Разность между кубом их суммы...» Стоп, давайте считать. Берём их сумму (3), и возводим её в куб (27). Читаем дальше: «... и суммой их квадратов». Сумма их квадратов: $1 + 4 = 5$. Итак, «Разность между кубом их суммы и суммой их квадратов» — это $27 - 5$, т. е. 22. И она должна быть... чётной! У нас и получилось чётное число, значит, мы решили задачу. Как мы помним, если мы приведём пример, для которого всё выполняется, — этого будет достаточно! Теперь мы готовы написать решение.

Решение. Да, существуют. Пример: 2 и 1;

$$(2 + 1)^3 - (2^2 + 1^2) = 27 - 5 = 22 \text{ — чётное число.}$$

И всё! Конечно, первый пример был выбран чуть проще, чем обычные задачи 19, но если усвоить методы, изложенные в этом «обсуждении», то реальные задачи тоже станут намного проще.

Пример 2. Рассматриваются конечные непостоянные арифметические прогрессии, состоящие из натуральных чисел, которые не имеют простых делителей, отличных от 2 и 3.

а) Может ли в этой прогрессии быть три числа?

б) Какое наибольшее количество членов может быть в этой прогрессии?

Обсуждение. Давайте пока закроем глаза на вопросы этой задачи и попробуем осмыслить условие, записанное в первой фразе, подкрепив осмысление примерами. Итак, рассматриваются арифметические прогрессии. Это понятно. Конечные — тоже ясно, значит, в них конечное число членов. Из натуральных чисел — запомнили, ничего дробного, отрицательного и нулевого там не бывает. «Не имеют простых делителей, отличных от 2 и 3». А вот с этим уже потруднее. Что же это значит? Попробуем для улучшения понимания привести похожую конструкцию, но далёкую от математики: «Сергей Евгеньевич не имеет машин, отличных от Феррари и Ламборгини». Но ведь это означает всего лишь то, что у Сергея Евгеньевича МОГУТ БЫТЬ только машины Феррари и Ламборгини! Кстати, их может и не быть: действительно, из того, что нет никаких других, не следует, что есть эти. Или может быть только Феррари. Или две Феррари. Важно другое: ничего, кроме них, нет!

Теперь вернёмся к задаче. Если у числа нет никаких простых делителей, кроме 2 и 3, это значит, что у него МОГУТ БЫТЬ простые делители 2 и 3 — и больше никаких, то есть искомые числа не делятся ни на 5, ни на 7, ни на 11, ни на другие простые числа, отличные от 2 и 3. Из этого опять же не следует, что искомое число имеет среди делителей 2 и 3: оно может иметь лишь один из этих делителей, а может и не иметь вовсе. Главное, чтобы не было никаких других, кроме 2 и 3.

Теперь давайте посмотрим на натуральные числа и выясним, какие из них обладают указанным свойством. Число 1 подходит? Да, у него вообще нет простых делителей (напомним, 1 — не простое и не составное число), а значит, нет и отличных от 2 и 3. Итак, 1 подходит. Число 2? Да, подходит, у этого числа есть лишь один простой делитель — 2. А значит, простых делителей, отличных от 2 и 3, нет. Аналогично подходит и 3. Число 4? Казалось бы, нет, ведь у этого числа есть делитель 4, отличный от 2 и 3. Но ведь 4 — не простое число, а нам противопоказаны только ПРОСТЫЕ делители, отличные от 2 и 3. А из простых делителей у четвёрки есть только двойка, она нас устраивает.

Число 5? А вот 5 не подходит, так как у этого числа есть простой делитель, отличный от 2 и 3, — это собственно 5. Как насчёт 6? Подходит, есть только 2 и 3. Число 7? Нет, есть простой делитель 7. Число 8? Подходит, среди простых делителей — только двойки. Число 9 — тоже, только тройки. Число 10 — нет, есть пятёрка. Итак, давайте выпишем те числа, которые подходят по условию и могут являться членами искомой прогрессии:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, ...

Ну вот, мы молодцы, теперь можно и вопрос задачи прочитать.

а) Может ли в этой прогрессии быть три числа?

И мы не верим своему счастью: пункт а) мы уже решили, сами того не заметив. Действительно, как и в прошлой задаче, мы можем ответить «Да, может» и привести пример такой прогрессии. В данном случае выбрать три числа из списка, приведённого выше, чтобы они образовывали арифметическую прогрессию, нетрудно! Например, 1, 2 и 3. Или 8, 12, 16. И так далее. Словом, с первым пунктом разобрались.

б) Какое наибольшее количество членов может быть в этой прогрессии?

Гипотезу мы можем высказать уже сейчас: четыре. Действительно, мы легко можем привести несколько прогрессий из четырёх членов (1, 2, 3, 4 или 4, 8, 12, 16), а для пяти — не можем. Это, конечно, не доказательство того, что прогрессий из пяти членов не бывает — мало ли, чего мы не можем. Скажем, авторы этой книги даже все вместе вряд ли смогут поднять штангу весом 300 кг, но из этого не следует, что такую штангу никто не сможет поднять!

Однако отметим вот что. Как вообще отвечать на данный вопрос? Ответ строится по такой схеме: «Наибольшее количество — _____, вот пример, когда это количество достигается, а больше не может быть по тому-то». Итак, на самом деле нам нужно сделать две вещи: привести пример, который иллюстрирует нашу оценку, и доказать, что оценка верна. Но даже если мы сделаем что-то одно, например, только докажем верную оценку (в данной задаче — докажем, что больше четырёх членов в прогрессии быть не может) либо только приведём пример с четырьмя членами — это уже существенное продвижение, которое может быть оценено. Правда, приводя пример без оценки, мы не можем быть уверены, что этот пример иллюстрирует верную оценку! Но в любом случае ничего не теряем. Так что пример для четырёх членов прогрессии в данной задаче также очень полезен.

Теперь приведём полное решение.

Решение. а) Да, может. Пример: 1, 2, 3.

б) В такой прогрессии может быть четыре члена: например, 1, 2, 3, 4.

Предположим, что существует такая арифметическая прогрессия, состоящая не менее чем из пяти членов. Рассмотрим любые пять последовательных её членов. Разделим каждый член на наибольший общий делитель всех пяти членов. Поскольку разности соседних членов уменьшатся в одинаковое количество раз, полученные числа a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 также образуют арифметическую прогрессию, удовлетворя-

ющую условию задачи. Заметим, что числа a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 не могут все быть чётными или все делиться на 3.

Если разность этой прогрессии делится на 3, то в ней не может быть члена, делящегося на 3 (иначе все члены прогрессии делятся на 3), поэтому все члены прогрессии являются степенями двойки. Поскольку все члены не могут быть чётными, получаем, что среди них присутствует 1. Но в этом случае разность прогрессии нечётна, поэтому чётные и нечётные члены прогрессии чередуются, а нечётных степеней двойки, отличных от 1, не существует.

Пусть теперь разность прогрессии d не делится на 3. Тогда если a_1 делится на 3, то члены $a_2 = a_1 + d, a_3 = a_1 + 2d$ и $a_5 = a_1 + 4d$ не делятся на 3, а $a_4 = a_1 + 3d$ делится на 3. Аналогично если a_2 делится на 3, то из чисел a_1, a_3, a_4, a_5 на 3 будет делиться только a_5 . Наконец, если a_3 делится на 3, то ни одно из чисел a_1, a_2, a_4, a_5 не делится на 3. Значит, найдутся два последовательных члена прогрессии, являющиеся степенями двойки.

Если оба эти члена чётны, то и все члены прогрессии чётны, чего не может быть. Поэтому одно из этих чисел — единица. Единица может стоять в прогрессии только на первом или пятом месте, в этом случае на 3 делится только a_3 , поскольку единица — один из двух последовательных членов прогрессии, являющихся степенью двойки. Тогда a_1, a_2, a_4, a_5 являются степенями двойки. Разность прогрессии $d = a_2 - a_1 = a_5 - a_4$, значит, она чётна, и все члены прогрессии чётны, чего не может быть.

Ответ. а) Да; б) 4.

Содержание критерия	Баллы
Верно выполнены оба пункта	4
Верно выполнен п. а и доказана оценка в п. б	3
Приведён пример или доказана оценка в п. б	2
Приведён пример в п. а	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	
	4

Пример 3. Натуральные числа от 1 до 12 разбивают на четыре группы, в каждой из которых есть по крайней мере два числа. Для каждой группы находят сумму чисел этой группы. Для каждой пары групп находят модуль разности найденных сумм и полученные 6 чисел складывают.

- Может ли в результате получиться 0?
- Может ли в результате получиться 1?
- Каково наименьшее возможное значение полученного результата?

Обсуждение. Опять же давайте пока не будем читать пункты а), б) и в), а попробуем просто разобраться, чего же от нас хотят, проиллюстрировав условие примером. Есть числа 1, 2, ..., 12. Их разбивают на четыре группы, в каждой из которых по крайней мере два числа. Так и сделаем: например,

$$\{1; 2; 3; 4\}, \quad \{5; 6; 7; 8\}, \quad \{9; 10\}, \quad \{11; 12\}.$$

Проверяем: четыре группы, в каждой не менее двух чисел. Далее, для каждой группы находят сумму чисел в этой группе. Найдём их для нашего примера: $S_1 = 10$, $S_2 = 26$, $S_3 = 19$, $S_4 = 23$. Для каждой пары групп находят модуль разности этих сумм. Найдём модули разностей:

$$\begin{aligned} |S_1 - S_2| &= 16, & |S_1 - S_3| &= 9, & |S_1 - S_4| &= 13, \\ |S_2 - S_3| &= 7, & |S_2 - S_4| &= 3, & |S_3 - S_4| &= 4. \end{aligned}$$

Полученные шесть чисел сложим (обозначим эту сумму через A) и убедимся, что мы ничего не забыли и чисел у нас получилось именно шесть:

$$A = 16 + 9 + 13 + 7 + 3 + 4 = 52.$$

Чем был полезен этот пример? Тем, что теперь мы твёрдо уверены, что понимаем условие задачи! Разбиваем на группы, считаем суммы по группам, далее — модули разностей сумм, и потом все складываем.

Теперь продолжаем читать условие.

а) Может ли в результате получиться 0?

Как мы помним, на этот вопрос можно ответить либо «Да» (и тогда нужно просто привести пример), либо «Нет» (и тогда нужно доказать, что сумма ни при каком разбиении не может быть равна нулю).

Сразу ноль у нас не получился — получилось 52. А как сделать это число поменьше? Ясно, что для того, чтобы сумма стала меньше, должны уменьшиться слагаемые. А что у нас за слагаемые? Это модули разностей некоторых чисел. Итак, складывая эти модули, мы должны получить ноль. Но ведь модули неотрицательны! Значит, ноль может получиться, только если мы складываем нули! Итак, для того чтобы получить в результате ноль, на предыдущем шаге мы должны получить шесть нулей.

А что мы делали на предыдущем шаге? Мы считали разности между суммами. И если они равны нулю, значит, все суммы должны быть равны между собой! Итак, для построения искомого примера нужно разбить числа 1, 2, ..., 12 на группы так, чтобы суммы чисел в группах были одинаковыми!

Дело за малым — сделать это. Давайте для начала посчитаем, какой тогда должна быть сумма чисел в каждой группе. Исходно сумма

чисел была $1 + 2 + \dots + 12 = 78$. Если мы разбиваем их на 4 группы, то в каждой группе сумма будет $78 : 4 = 19,5$. Как же так? Сумма же не может быть нецелой. Что это значит? А это значит, что такого разбиения не существует, и мы это только что доказали!

Теперь пункт б). Может ли сумма A быть равной 1? Опять же нам нужно либо привести пример того, когда это бывает, либо доказать, что это невозможно.

Так как A есть сумма шести неотрицательных целых чисел, это возможно только в том случае, когда одна из разностей по модулю равна единице, а все остальные модули разностей (а значит, и сами разности) — нули. Как это возможно? Давайте, не теряя общности, считать, что $S_1 - S_2 \neq 0$, а остальные разности равны нулю, то есть

$$S_1 - S_3 = S_1 - S_4 = S_2 - S_3 = S_2 - S_4 = S_3 - S_4 = 0.$$

Однако из последнего равенства следует, что все суммы равны между собой! А ведь это противоречит тому, что $S_1 - S_2 \neq 0$! Итак, искомая сумма не может быть также равна и 1.

Остался пункт в). Здесь нам нужно сделать три вещи: придумать правильный ответ, доказать, что он действительно наименьший, и представить пример, когда такое значение достигается (то есть привести такое разбиение на четыре группы, при котором искомая сумма модулей разностей равна указанному нами числу).

Прежде всего давайте попробуем дойти до правильного ответа. Нам нужно, чтобы сумма модулей разностей была наименьшей, значит, в идеале мы должны сделать модули разностей как можно меньше. А когда они будут маленькими? Конечно, когда числа, которые мы вычитаем, стоят как можно ближе друг к другу (опять же, в идеале — чтобы они все были равными). Значит, нам нужно составить группы так, чтобы суммы чисел в них были равны между собой или максимально близки друг к другу.

Как мы знаем из первого пункта, равны между собой они быть не могут, так как 78 не делится на 4 нацело. Однако из того же первого пункта мы видим, что, если разделить 78 на 4, будет 19,5. Значит было бы логично составить такие группы, чтобы сумма в них была близка к 19,5, то есть была равна 19 или 20. Попробуем сделать две группы по 19 и две по 20. В этом случае общая сумма будет как раз 78, а если посчитать попарные разности, то среди них будет 4 единицы и два нуля, то есть искомое число A будет равно 4. Неплохо, хотя мы пока не доказали, что это минимально возможный вариант. Тем не менее, очень похоже на то, что мы не ошиблись.

Однако это ещё не пример: мы пока лишь привели суммы чисел в группах, но не разбиение по группам. Впрочем, это не так сложно. Выпишем все числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Теперь в первую группу возьмём числа с суммой чисел 20: например, {12; 8}. Во вторую — также с суммой 20 — к примеру, {11; 9}. Теперь в третью нужны числа с суммой 19. Берём {10; 7; 2}. Ну а сумма оставшихся, разумеется, тоже равна 19 (так как общая сумма — 78). Итак, разбиение, дающее ответ 4, например, таково (есть и другие примеры; см. ниже): {12; 8}, {11; 9}, {10; 7; 2} и {6; 5; 4; 3; 1}.

Теперь нужно доказать, что число 4 наименьшее. Но об этом — уже в решении.

Решение. Обозначим суммы чисел в группах S_1, S_2, S_3, S_4 , а указанную в условии сумму модулей их попарных разностей через A . Можно считать, что $S_1 \leq S_2 \leq S_3 \leq S_4$.

а) Чтобы число A равнялось 0, необходимо, чтобы каждая из разностей $S_i - S_j$ равнялась 0, то есть $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$. Сумма всех двенадцати чисел равна

$$1 + 2 + \dots + 11 + 12 = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78.$$

С другой стороны, она равна

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 4S_1,$$

но 78 не делится на 4. Значит, $A \neq 0$.

б) Чтобы число A равнялось 1, необходимо, чтобы все, кроме одной, разности $S_i - S_j$ равнялись 0. Значит, $S_1 < S_4$, но в этом случае каждая из сумм S_2, S_3 не равна хотя бы одной из сумм S_1, S_4 , поэтому хотя бы три разности $S_i - S_j$ не равны 0 и число A не меньше 3. Значит, $A \neq 1$.

в) Выразим число A явно через S_1, S_2, S_3, S_4 :

$$\begin{aligned} A &= (S_2 - S_1) + (S_3 - S_1) + (S_4 - S_1) + (S_3 - S_2) + (S_4 - S_2) + (S_4 - S_3) = \\ &= 3(S_4 - S_3) + 4(S_3 - S_2) + 3(S_2 - S_1). \end{aligned}$$

В предыдущих пунктах было показано, что $A \geq 3$. Если $A = 3$, то

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 - 1 \quad \text{или} \quad S_2 = S_3 = S_4 = S_1 + 1.$$

В этом случае сумма всех двенадцати чисел равна $4S_1 + 1$ или $4S_4 - 1$, то есть нечётна, что неверно.

Для следующего разбиения чисел на группы: $\{12; 7\}$; $\{11; 6; 2\}$; $\{10; 5; 4; 1\}$; $\{9; 8; 3\}$ — число A равно 4.

Ответ. а) Нет; б) нет; в) 4.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

В завершение этого параграфа мы предлагаем несколько задач из вариантов ЕГЭ без подробного обсуждения, однако очень рекомендуем читателю попробовать применить только что прочитанные идеи в этих задачах. Внимательно читайте условие, иллюстрируйте его примерами, и всё получится!

Пример 4. В ряд выписаны числа $1^2, 2^2, \dots, (N-1)^2, N^2$. Между ними произвольным образом расставляют знаки «+» и «-» и находят получившуюся сумму. Может ли такая сумма равняться:

- а) 4, если $N = 12$? б) 0, если $N = 69$?
в) 0, если $N = 64$? г) 5, если $N = 90$?

Решение. а) При следующей расстановке знаков получается требуемая сумма:

$$1^2 - 2^2 - 3^2 + 4^2 + 5^2 - 6^2 - 7^2 + 8^2 - 9^2 + 10^2 + 11^2 - 12^2 = 4.$$

б) Среди выписанных 69 чисел — 34 чётных и 35 нечётных. Поэтому любая сумма, которую можно получить, будет нечётной и не может равняться 0.

в) Заметим, что $(a+3)^2 - (a+2)^2 - (a+1)^2 + a^2 = 4$. Значит, между 8 квадратами последовательных натуральных чисел можно расставить знаки так, что полученная сумма будет равняться 0:

$$(a+7)^2 - (a+6)^2 - (a+5)^2 + (a+4)^2 - (a+3)^2 + (a+2)^2 + (a+1)^2 - a^2 = 0.$$

При $N = 64$ можно разбить все данные числа на группы по 8 чисел в каждой так, что сумма чисел в каждой группе равна 0, а значит, и сумма всех чисел равна 0.

г) Как и в предыдущем пункте, расставим знаки между 88 числами $3^2, 4^2, \dots, 89^2, 90^2$ таким образом, чтобы их сумма равнялась 0. Пе-

ряд 2^2 поставим знак «+». При такой расстановке знаков сумма равна

$$1^2 + 2^2 + 0 = 5.$$

Ответ. а) Да; б) нет; в) да; г) да.

Содержание критерия	Баллы
Верно выполнены все пункты	4
Верно выполнены три пункта из четырёх	3
Верно выполнены два пункта из четырёх	2
Верно выполнен один пункт из четырёх	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 5. Число S таково, что для любого представления S в виде суммы положительных слагаемых, каждое из которых не превосходит 1, эти слагаемые можно разделить на две группы так, что каждое слагаемое попадает только в одну группу и сумма слагаемых в каждой группе не превосходит 19.

а) Может ли число S быть равным 38?

б) Может ли число S быть больше 37,05?

в) Найдите максимальное возможное значение S .

Решение. а) Рассмотрим разбиение числа 38 на 39 слагаемых, равных $\frac{38}{39}$. При разделении этих слагаемых на две группы в одной из них окажется не менее 20 чисел, сумма которых равна

$$20 \cdot \frac{38}{39} = \frac{760}{39} = 19\frac{19}{39} > 19.$$

Значит, S не может быть равным 38.

б) Поскольку S является суммой двух чисел, не больших 19, получаем $S \leq 38$.

Пусть $37,05 < S \leq 38$. Рассмотрим разбиение числа S на 39 слагаемых, равных $\frac{S}{39} \leq \frac{38}{39} < 1$. При разделении этих слагаемых на две группы в одной из них окажется не менее 20 чисел, сумма которых равна $20 \cdot \frac{S}{39} > 20 \cdot \frac{37,05}{39} = 19$. Значит, S не может быть больше 37,05.

в) Докажем, что число $S = 37,05$ удовлетворяет условию задачи.

Рассмотрим произвольное представление числа $S = 37,05$ в виде суммы положительных слагаемых, не превосходящих 1:

$$S = x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

Можно считать, что слагаемые упорядочены по убыванию:

$$x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_{n-1} \geq x_n.$$

Первую группу составим из k наибольших слагаемых так, что

$$S_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_k \leq 19 < x_1 + x_2 + \dots + x_k + x_{k+1}.$$

Вторую группу составим из оставшихся слагаемых.

Пусть $S_1 < 18,05 = 37,05 - 19$. В этом случае

$$0,95 < 19 - S_1 < x_{k+1} \leq x_k \leq \dots \leq x_1, \quad 0,95k < x_1 + \dots + x_k = S_1 < 18,05.$$

Поэтому $k < 19$, $k \leq 18$ и $S_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_k \leq 18$. Тогда

$$1 \leq 19 - S_1 < x_{k+1} \leq 1.$$

Полученное противоречие доказывает, что $S_1 \geq 18,05$. Поэтому

$$S_2 = x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n = 37,05 - S_1 \leq 19.$$

Таким образом, число $S = 37,05$ удовлетворяет условию задачи. В предыдущем пункте было показано, что ни одно из чисел $S > 37,05$ не удовлетворяет условию задачи, значит, максимальное возможное значение S — это $37,05$.

Ответ. а) Нет; б) нет; в) $37,05$.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — указание верного способа разделения слагаемых на две группы для искомого значения S в п. в; — обоснование верного способа разделения слагаемых на две группы для искомого значения S в п. в	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 6. Каждый из группы учащихся сходил в кино или в театр, при этом возможно, что кто-то из них мог сходить и в кино, и в театр. Известно, что в театре мальчиков было не более $\frac{2}{11}$ от общего числа учащихся группы, посетивших театр, а в кино мальчиков было не более $\frac{2}{5}$ от общего числа учащихся группы, посетивших кино.

а) Могло ли быть в группе 9 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?

б) Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?

в) Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в группе без дополнительного условия пунктов а) и б).

Решение. а) Если группа состоит из 2 мальчиков, посетивших только театр, 7 мальчиков, посетивших только кино, и 11 девочек, сходявших и в театр, и в кино, то условие задачи выполнено. Значит, в группе из 20 учащихся могло быть 9 мальчиков.

б) Предположим, что мальчиков было 10 или больше. Тогда девочек было 10 или меньше. Театр посетило не более 2 мальчиков, поскольку если бы их было 3 или больше, то доля мальчиков в театре была бы не меньше $\frac{3}{3+10} = \frac{3}{13}$, что больше $\frac{2}{11}$. Аналогично кино посетило не более 7 мальчиков, поскольку $\frac{8}{8+10} = \frac{8}{18} > \frac{2}{5}$, но тогда хотя бы один мальчик не посетил ни театра, ни кино, что противоречит условию.

В предыдущем пункте было показано, что в группе из 20 учащихся могло быть 9 мальчиков. Значит, наибольшее количество мальчиков в группе — 9.

в) Предположим, что некоторый мальчик ходил и в театр, и в кино. Если бы вместо него в группе присутствовало два мальчика, один из которых посетил только театр, а другой — только кино, то доля мальчиков и в театре, и в кино осталась бы прежней, а общая доля девочек стала бы меньше. Значит, для оценки наименьшей доли девочек в группе можно считать, что каждый мальчик ходил или только в театр, или только в кино.

Пусть в группе m_1 мальчиков, посетивших театр, m_2 мальчиков, посетивших кино, и d девочек. Оценим долю девочек в этой группе. Будем считать, что все девочки ходили и в театр, и в кино, поскольку их доля в группе от этого не изменится, а доля в театре и в кино не уменьшится.

По условию $\frac{m_1}{m_1+d} \leq \frac{2}{11}$, $\frac{m_2}{m_2+d} \leq \frac{2}{5}$, значит, $\frac{m_1}{d} \leq \frac{2}{9}$, $\frac{m_2}{d} \leq \frac{2}{3}$. Тогда $\frac{m_1+m_2}{d} \leq \frac{8}{9}$, поэтому доля девочек в группе:

$$\frac{d}{m_1+m_2+d} = \frac{1}{\frac{m_1+m_2}{d}+1} \geq \frac{1}{\frac{8}{9}+1} = \frac{9}{17}.$$

Если группа состоит из 2 мальчиков, посетивших только театр, 6 мальчиков, посетивших только кино, и 9 девочек, сходявших и в театр, и в кино, то условие задачи выполнено, а доля девочек в группе равна $\frac{9}{17}$.

Ответ. а) Да; б) 9; в) $\frac{9}{17}$.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 7. Каждое из чисел 2, 3, ..., 7 умножают на каждое из чисел 13, 14, ..., 21 и перед каждым из полученных произведений произвольным образом ставят знак плюс или минус, после чего все 54 полученных результата складывают. Какую наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге?

Решение. 1. Если все произведения взяты со знаком плюс, то их сумма максимальна и равна

$$(2 + \dots + 7)(13 + \dots + 21) = \left(\frac{2+7}{2} \cdot 6\right) \cdot \left(\frac{13+21}{2} \cdot 9\right) = 27 \cdot 153 = 4131.$$

2. Так как предыдущая сумма оказалась нечётной, число нечётных слагаемых в ней нечётно, причём это свойство всей суммы не меняется при смене знака любого её слагаемого. Поэтому любая из получающихся сумм будет нечётной, а значит, не будет равна 0.

3. Значение 1 сумма принимает, например, при такой расстановке знаков у произведений, которая получится при раскрытии следующих скобок:

$$(-2+3-4+5+6-7)(-13-14-15-16+17-18+19+20+21) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Ответ. 1 и 4131.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен правильный ответ	4
Ответ правилен, но недостаточно обоснован (например, не доказано, что сумма отлична от 0 либо что она может быть равна 1)	3
Верно найдено наибольшее значение суммы и доказано, что сумма всегда отлична от 0	2
Верно найдено только наибольшее значение суммы или только доказано, что сумма всегда отлична от 0	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 8. Перед каждым из чисел 22, 23, ..., 26 и 50, 51, ..., 60 произвольным образом ставят знак плюс или минус, после чего к каждому из образовавшихся чисел первого набора прибавляют каждое из образовавшихся чисел второго набора, а затем все 55 полученных результатов складывают. Какую наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге?

Решение. 1. Если все числа взяты со знаком плюс, то их сумма максимальна и равна

$$11(22 + \dots + 26) + 5(50 + \dots + 60) = \\ = 11\left(\frac{22+26}{2} \cdot 5\right) + 5\left(\frac{50+60}{2} \cdot 11\right) = 55 \cdot (24 + 55) = 4345.$$

2. Так как предыдущая сумма оказалась нечётной, число нечётных слагаемых в ней нечётно, причём это свойство всей суммы не меняется при смене знака любого её слагаемого. Поэтому любая из получающихся сумм будет нечётной, а значит, не будет равна 0.

3. Значение 1 сумма принимает, например, при следующей расстановке знаков у чисел:

$$11(-22 + 23 - 24 + 25 - 26) + \\ + 5(50 + 51 - 52 - 53 + 54 - 55 + 56 - 57 + 58 - 59 + 60) = \\ = -11 \cdot 24 + 5 \cdot 53 = -264 + 265 = 1.$$

Ответ. 1 и 4345.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен правильный ответ	4
Ответ правилен, но недостаточно обоснован (например, не доказано, что сумма отлична от 0 либо что она может быть равна 1)	3
Верно найдено наибольшее значение суммы и доказано, что она всегда отлична от 0	2
Верно найдено только наибольшее значение суммы или только доказано, что она всегда отлична от 0	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 9. Найдите все тройки натуральных чисел k , m и n , удовлетворяющие уравнению $2 \cdot k! = m! - 2 \cdot n!$ ($1! = 1$; $2! = 1 \cdot 2 = 2$; $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$).

Решение. 1. Так как $m! = 2 \cdot k! + 2 \cdot n!$, имеем $n < m$ и $k < m$.

2. Пусть $k \leq n$, тогда $4 \cdot n! \geq 2 \cdot k! + 2 \cdot n! = m! \geq (n+1) \cdot n!$, откуда $4 \geq n+1$ и $k \leq n \leq 3$.

3. Пусть $k > n$, тогда $4 \cdot k! \geq 2 \cdot k! + 2 \cdot n! = m! \geq (k+1) \cdot k!$, откуда $4 \geq k+1$ и $n < k \leq 3$.

4. Далее конечным перебором значений $1 \leq n \leq 3$, $1 \leq k \leq 3$ находим все решения.

Ответ. $k=1, n=2, m=3$; $k=n=3, m=4$; $k=2, n=1, m=3$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен правильный ответ	4
Ответ правилен и конечность перебора обоснована. Однако при переборе допущены арифметические ошибки или пробелы	3
Ответ правилен и получен конечным перебором. Однако конечность перебора не обоснована	2
Приведён хотя бы один из правильных наборов, и проверено, что при подстановке в уравнение получается верное числовое равенство	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 10. Найдите все пары натуральных чисел a и b , удовлетворяющие равенству $\overline{ab} = a^b + 23$ (в левой части равенства стоит число, получаемое приписыванием десятичной записи числа a перед десятичной записью числа b).

Решение. В случаях $a=1$ или $b=1$ имеем $24 = 1^b + 23 = \overline{1b}$ или $a^1 + 23 = \overline{a1} = 10a + 1$, что невозможно. Далее считаем, что $a > 1$ и $b > 1$.

Пусть $a \leq 9$. Тогда для выполнения равенства необходимо условие $b \leq 9$, так как иначе, если b — k -значное число ($k \geq 2$), имеем

$$a^b \geq 2^{10^{k-1}} \geq 2^{10(k-1)} > 10^{3(k-1)} = 10^{k+(2k-3)} \geq 10^{k+1} > \overline{ab}.$$

Пусть $a \geq 10$. Тогда для выполнения равенства необходимы условия $b=2$ и $a \leq 31$, так как иначе, предполагая, что b — k -значное число, а a — $(m+1)$ -значное число ($m \geq 1$), имеем,

если $k > 1$, то

$$a^b \geq (10^m)^{10^{k-1}} \geq 10^{m \cdot (k+2)} = 10^{(m+m)+m \cdot k} \geq 10^{(m+1)+k} > \overline{ab};$$

если $k=1$, $b \geq 3$, то

$$a^b \geq (10^m)^3 = 10^{(m+m)+m} \geq 10^{(m+1)+k} > \overline{ab};$$

если $k=1$, $b=2$, $m \geq 2$, то

$$a^b \geq (10^m)^2 = 10^{(m+\frac{m}{2})+\frac{m}{2}} \geq 10^{(m+1)+k} > \overline{ab};$$

если $k = 1$, $b = 2$, $m = 1$, $a \geq 32$, то

$$a^b \geq (32)^2 \geq 10^3 = 10^{(m+1)+k} > \overline{ab}.$$

Конечным перебором всех пар a и b , для которых

либо $1 < a \leq 9$ и $1 < b \leq 9$, либо $10 \leq a \leq 31$ и $b = 2$,

получаем, что уравнению удовлетворяют две пары: $a = 3$, $b = 2$; $a = 7$, $b = 2$.

Ответ. $a = 3$, $b = 2$; $a = 7$, $b = 2$.

Замечание. Перебор значений a и b может быть произведён с помощью дополнительных соображений (свойств делимости, оценок величин и т. п.), например, следующим образом.

Остаётся две возможности: либо $1 < a \leq 9$ и $1 < b \leq 9$, либо $10 \leq a \leq 31$ и $b = 2$.

В первом случае, если $a = 2$, имеем $20 + b = 2^b + 23$, но $23 > 20$, а $2^b > b$.

Если $a = 3$, имеем $30 + b = 3^b + 23$.

При $b > 3$ в правой части стоит число, состоящее более чем из двух цифр. Несложно проверить, что случай $b = 2$ подходит, а $b = 3$ — нет.

Если $a = 4$, имеем $40 + b = 4^b + 23$.

При $b > 3$ в правой части стоит число, состоящее более чем из двух цифр. Несложно проверить, что случаи $b = 2$ и $b = 3$ не подходят.

При $a \geq 5$, если $b > 2$, в правой части стоит число, состоящее более чем из двух цифр.

Значит, имеем уравнение $10a + 2 = a^2 + 23$; $a^2 - 10a + 21 = 0$, откуда получаем $a = 3$ и $a = 7$.

Во втором случае имеем уравнение $10a + 2 = a^2 + 23$, решения которого меньше 10.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен правильный ответ	4
Ответ правилен, но недостаточно обоснован: правильно произведён перебор не более чем двузначных оснований степени и не более чем однозначных её показателей, но не объяснено, почему перебор ограничен только перечисленными случаями	3
Ответ содержит правильную и, возможно, одну неправильную пару. Произведён перебор не более чем однозначных её показателей, но с арифметическими ошибками или пробелами	2
Приведена правильная пара, и проверено, что она обращает уравнение в верное числовое равенство	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 11. На доске написали несколько (не обязательно различных) двузначных натуральных чисел, не имеющих нулей в десятичной записи. Сумма этих чисел оказалась равной 363. В каждом числе поменяли местами первую и вторую цифры (например, число 17 заменили на число 71).

а) Приведите пример чисел, для которых сумма получившихся чисел ровно в 4 раза больше, чем сумма исходных чисел.

б) Могла ли сумма получившихся чисел оказаться ровно в 2 раза больше, чем сумма исходных чисел?

в) Найдите наибольшее возможное значение суммы получившихся чисел.

Решение. а) Пусть на доске 15 раз было записано число 19 и один раз число 78. Тогда сумма чисел равна 363. После перестановки цифр оказалось 15 раз записано число 91 и один раз 87. Сумма этих чисел равна $1452 = 4 \cdot 363$.

Замечание. Этот ответ берётся не «с потолка». Прочитайте решение пункта б) и заметьте, что аналогично можно ввести обозначения и в пункте а), после чего решить систему, найдя A и B . Дальше — нехитрый подбор.

б) Пусть на доске написаны двузначные числа $\overline{a_1 b_1}, \dots, \overline{a_n b_n}$. Обозначим

$$A = a_1 + \dots + a_n, \quad B = b_1 + \dots + b_n.$$

По условию $10A + B = 363$ и $10B + A = 2 \cdot 363$. Тогда разность этих чисел равна $9(B - A) = 363$. Но левая часть последнего равенства делится на 9, а правая не делится. Значит, такая ситуация невозможна.

в) Пусть на доске были написаны двузначные числа $\overline{a_1 b_1}, \dots, \overline{a_n b_n}$. По-прежнему

$$A = a_1 + \dots + a_n, \quad B = b_1 + \dots + b_n.$$

По условию $10A + B = 363$, и нужно найти наибольшее значение числа $S = 10B + A$. Тогда

$$S = 10B + A = 10(363 - 10A) + A = 3630 - 99A.$$

Таким образом, необходимо найти наименьшее возможное значение числа A . Поскольку

$$b_1 \leq 9a_1, \dots, b_n \leq 9a_n, \quad (*)$$

получаем $B \leq 9A$. Поэтому

$$363 = 10A + B \leq 10A + 9A = 19A,$$

откуда $A \geq \frac{363}{19} > 19$, т. е. $A \geq 20$. Значит,

$$S = 3630 - 99A \leq 3630 - 99 \cdot 20 = 1650.$$

Теперь приведём пример, показывающий, что число S может быть равным 1650. Пусть первоначально на доске 18 раз было записано число 19 и один раз число 21. Тогда сумма этих чисел равна 363. После перестановки цифр на доске 18 раз оказалось записано число 91 и один раз число 12. Сумма этих чисел равна 1650.

Ясно, что этот пример получается, если почти все цифры десятков исходных чисел равны 1, а цифры единиц равны 9, чтобы почти все неравенства (*) обратились в равенства.

Ответ. а) Например, 15 раз число 19 и число 78; б) нет; в) 1650.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — пример в п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	
	4

Пример 12. На доске было написано 30 натуральных чисел (не обязательно различных), каждое из которых не превосходит 40. Среднее арифметическое всех написанных чисел было равно 7. Вместо каждого из чисел на доске написали число, вдвое меньшее первоначального. Числа, оказавшиеся после этого меньше 1, с доски стёрли.

а) Могло ли среднее арифметическое чисел, оставшихся на доске, стать больше 14?

б) Могло ли среднее арифметическое оставшихся на доске чисел стать больше 12, но меньше 13?

в) Найдите максимальное возможное значение среднего арифметического оставшихся на доске чисел.

Решение. а) Пусть на доске было 24 числа, равных 1, и 6 чисел, равных 31. Их среднее арифметическое равно 7. Среднее арифметическое получившихся чисел равно $\frac{6 \cdot 15,5}{6} = 15,5 > 14$.

б) Пусть с доски было стёрто k чисел, и пусть сумма оставшихся была равна S , а значит, стала равна $\frac{S}{2}$. По условию оказались стёрты только числа, получившиеся из 1, поэтому $\frac{S+k}{30} = 7$, т. е. $S = 210 - k$. Среднее арифметическое оставшихся чисел равно $\frac{S}{2(30-k)}$, откуда получаем

$$12 < \frac{210-k}{2(30-k)} < 13; \quad 720 - 24k < 210 - k < 780 - 26k;$$

$$22 < \frac{510}{23} < k < \frac{114}{5} < 23.$$

Но таких целых чисел k нет.

в) В обозначениях решения предыдущего пункта необходимо найти наибольшее возможное значение числа $A = \frac{S}{2(30-k)}$. Имеем

$$A = \frac{S}{2(30-k)} = \frac{210-k}{2(30-k)} = \frac{1}{2} + \frac{90}{30-k}.$$

Число A будет наибольшим, если число k будет принимать наибольшее возможное значение. Оценим значение k .

Каждое из первоначально написанных на доске чисел было не более 40 и на доске осталось $30 - k$ чисел, поэтому для суммы S выполняется неравенство

$$210 - k = S \leq 40(30 - k),$$

откуда

$$210 - k \leq 40(30 - k); \quad 39k \leq 990; \quad k \leq \frac{330}{13} < 26; \quad k \leq 25.$$

Значит,

$$A \leq \frac{1}{2} + \frac{90}{30-25} = 18,5.$$

Приведём пример, показывающий, что среднее арифметическое оставшихся на доске чисел действительно может стать равным 18,5. Пусть первоначально на доске было написано 25 единиц и 5 чисел, равных 37. Тогда их среднее арифметическое было равно $\frac{25+185}{30} = 7$. Все единицы стёрли с доски, а остальные числа уменьшились в 2 раза. Тогда среднее арифметическое оставшихся чисел равно $\frac{5 \cdot 37}{2 \cdot 5} = 18,5$.

Ясно, что пример получается при найденном наибольшем значении k , т. е. необходимо удалить 25 единиц.

Ответ. а) Да; б) нет; в) 18,5.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 13. На доске было написано 20 натуральных чисел (не обязательно различных), каждое из которых не превосходит 40. Вместо нескольких (возможно, одного) из чисел на доске написали числа, меньшие первоначальных на 1. Числа, которые после этого оказались равными 0, с доски стёрли.

а) Могло ли среднее арифметическое чисел на доске увеличиться после произведённой операции?

б) Среднее арифметическое первоначально написанных чисел было равно 27. Могло ли среднее арифметическое оставшихся на доске чисел получиться равным 34?

в) Среднее арифметическое первоначально написанных чисел было равно 27. Найдите максимальное возможное значение среднего арифметического оставшихся на доске чисел.

Решение. а) Пусть первоначально на доске было 19 чисел, равных 10, и одно число, равное 1. Их среднее арифметическое равно $\frac{19 \cdot 10 + 1}{20} = 9,55$. Уменьшим число, равное 1, после чего оно исчезнет с доски, а остальные числа менять не будем. Среднее арифметическое оставшихся чисел равно $\frac{19 \cdot 10}{19} = 10$.

б) Пусть с доски было стёрто k чисел, сумма остальных чисел до уменьшения была равна S , а после уменьшения стала равна $S - n$ т. е. было изменено n чисел, бóльших 1. По условию $\frac{S+k}{20} = 27$, т. е. $S = 540 - k$. Среднее арифметическое оставшихся чисел равно

$$\frac{S-n}{20-k} = 34,$$

откуда получаем

$$\frac{540 - k - n}{20 - k} = 34.$$

Из этого равенства находим $33k = 140 + n$. Число n лежит в пределах от 0 до 20, поэтому $140 + n$ лежит в пределах от 140 до 160. В этом промежутке нет целых чисел, делящихся на 33.

в) В обозначениях предыдущего пункта по-прежнему $\frac{S+k}{20} = 27$, т. е. $S = 540 - k$. Необходимо найти максимальное возможное значение числа $A = \frac{S-n}{20-k}$. Имеем

$$A = \frac{S-n}{20-k} = \frac{540-k-n}{20-k} \leq \frac{540-k}{20-k} = 1 + \frac{520}{20-k}.$$

Число A будет наибольшим, если $n = 0$ и число k будет принимать наибольшее возможное значение. Оценим это значение. Так как каждое из первоначально написанных на доске чисел было не более 40 и на доске осталось $20 - k$ чисел, для суммы S выполняется неравенство

$$540 - k = S \leq 40(20 - k),$$

откуда

$$540 - k \leq 40(20 - k); \quad 39k \leq 260; \quad k \leq \frac{20}{3} < 7; \quad k \leq 6.$$

Значит,

$$A \leq 1 + \frac{520}{20-k} \leq 1 + \frac{520}{14} = 38\frac{1}{7}.$$

Приведём пример, показывающий, что среднее арифметическое оставшихся на доске чисел действительно могло стать равным $38\frac{1}{7}$. Пусть первоначально на доске было написано 6 единиц, 13 чисел, равных 40, и одно число, равное 14. Тогда их среднее арифметическое было равно

$$\frac{6 + 13 \cdot 40 + 14}{20} = 27.$$

Пусть 6 чисел, равных единице, уменьшились на 1 (после чего были стёрты с доски), а остальные числа не изменились. Тогда среднее арифметическое оставшихся чисел равно

$$\frac{13 \cdot 40 + 14}{14} = 38\frac{1}{7}.$$

Ясно, что пример легко получается при найденном наибольшем возможном k , т. е. среди написанных чисел должно быть 6 единиц.

Ответ. а) Да; б) нет; в) $38\frac{1}{7}$.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 14. Ученики писали тест. Результатом каждого ученика является целое неотрицательное число баллов. Ученик считается сдавшим тест, если он набрал не менее 83 баллов. Из-за того, что задания оказались трудными, всем участникам теста добавили по 5 баллов, благодаря чему количество сдавших тест увеличилось.

а) Мог ли средний балл участников, не сдавших тест, понизиться?

б) Мог ли средний балл участников, сдавших тест, понизиться и средний балл участников, не сдавших тест, тоже понизиться?

в) Известно, что первоначально средний балл участников теста составил 90, средний балл участников, сдавших тест, составил 100, а средний балл участников, не сдавших тест, составил 75. После добавления баллов средний балл участников, сдавших тест, стал равен 103, а не сдавших тест — 79. При каком минимальном числе участников теста возможна такая ситуация?

Решение. а) Пусть были 3 участника, которые набрали 100, 82 и 2 балла. Средний балл участников, не сдавших тест, составлял $\frac{82+2}{2} = 42$ балла. После добавления баллов у участников оказалось 105, 87 и 7 баллов. Теперь средний балл участников, не сдавших тест, составляет 7 баллов.

б) В примере из предыдущего пункта средний балл участников теста, сдавших тест, первоначально составлял 100 баллов, а после добавления баллов составил $\frac{105+87}{2} = 96$ баллов.

в) Пусть всего было N участников теста, сдали тест a участников, после добавления баллов сдали тест b участников. Очевидно, что средний балл всех участников после добавления составил 95. Имеем

два уравнения:

$$90N = 75(N - a) + 100a \quad \text{и} \quad 95N = 79(N - b) + 103b,$$

откуда $15N = 25a$, т. е. $3N = 5a$, и $16N = 24b$, т. е. $2N = 3b$. Поэтому целое число N кратно 5 и кратно 3, т. е. кратно 15. Таким образом, $N \geq 15$.

Теперь покажем, что N могло равняться 15. Пусть изначально 5 участников набрали по 74 балла, 1 участник — 80 баллов и 9 участников по 100 баллов. Тогда средний балл был равен 90, средний балл участников, сдавших тест, был равен 100, а средний балл участников, не сдавших тест, был равен 75. После добавления средний балл участников, сдавших тест, стал равен 103, средний балл участников, не сдавших тест, стал равен 79. Таким образом, все условия выполнены.

Ответ. а) Да; б) да; в) 15.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 15. а) Приведите пример четырёхзначного числа, произведение цифр десятичной записи которого в 10 раз больше суммы цифр этого числа.

б) Существует ли такое четырёхзначное число, произведение цифр десятичной записи которого в 175 раз больше суммы цифр этого числа?

в) Найдите все такие четырёхзначные числа, произведение цифр десятичной записи которых в 50 раз больше суммы цифр этого числа.

Решение. а) Произведение цифр числа 2529 равно 180, а сумма цифр равна 18, т. е. в 10 раз меньше.

б) Предположим, что такое число $n = \overline{abcd}$ существует. Очевидно, что среди этих цифр не может быть нулей.

Имеем $abcd = 175(a + b + c + d)$. Правая часть этого равенства делится на 25, поэтому среди цифр найдутся две цифры 5. Так как при перестановке местами цифр числа n равенство $abcd = 175(a + b + c + d)$

остаётся верным, без ограничения общности можно считать, что в числе n цифры c и d равны 5.

Тогда $ab = 7(a + b + 10) \geq 7 \cdot 12 > 9 \cdot 9 \geq ab$. Получаем противоречие.

в) Предположим, что такое число $n = \overline{abcd}$ существует. Как и ранее, заметим, что среди этих цифр не может быть нулей. Имеем $abcd = 50(a + b + c + d)$. Правая часть этого равенства делится на 25, поэтому среди цифр найдутся две цифры 5. Без ограничения общности будем считать, что $c = d = 5$.

Тогда $ab = 2(a + b + 10)$. Так как правая часть последнего равенства чётна, a или b чётны. Без ограничения общности будем считать, что b чётно.

Если $b = 2$, то $a = a + 12$, что невозможно.

Если $b = 4$, то $2a = a + 14$; $a = 14$, что невозможно.

Если $b = 6$, то $3a = a + 16$; $2a = 16$; $a = 8$. Число $n = 8655$ и все числа, получаемые из него перестановкой цифр, удовлетворяют условию задачи.

Если $b = 8$, то $4a = a + 18$; $3a = 18$; $a = 6$. Этот вариант также получается из предыдущего перестановкой цифр.

Ответ. а) Например, 2529; б) нет; в) число 8655 и все числа, получаемые из него перестановкой цифр (всего 12 чисел).

Содержание критерия	Баллы
Верно построен пример в п. а, и обоснованно получены верные ответы в п. б и п. в	4
Обоснованно получены ответ в п. в и один из следующих результатов: — пример в п. а; — обоснованное решение п. б	3
Верно построен пример в п. а, и обоснованно получен ответ в п. б. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в п. в	2
Верно построен пример в п. а. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в п. б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	
	4

Пример 16. Три вещественных числа назовём *замечательной* тройкой, если они могут быть длинами сторон треугольника.

Три вещественных числа назовём *прекрасной* тройкой, если они могут быть длинами сторон прямоугольного треугольника.

а) Даны 5 различных натуральных чисел. Может ли оказаться, что среди них не найдётся ни одной замечательной тройки?

б) Даны 4 различных натуральных числа. Может ли оказаться, что среди них можно найти три прекрасные тройки?

в) Даны 10 различных чисел (необязательно натуральных). Какое максимальное количество прекрасных троек может оказаться среди них?

Решение. а) Если числа равны 1, 2, 4, 8 и 16, то никакие три из них не образуют замечательную тройку.

б) Если одно из чисел является длиной гипотенузы для двух треугольников, то какое-то из оставшихся трёх чисел является длиной катета для этих двух треугольников, а тогда треугольники окажутся равными по гипотенузе и катету. Значит, каждое число может быть длиной гипотенузы не более чем одного треугольника. При этом два самых маленьких числа не могут являться длиной гипотенузы треугольника. Значит, среди четырёх чисел можно найти не более двух прекрасных троек.

в) Упорядочим числа по возрастанию. Самое большое из них может быть длиной гипотенузы не более чем в четырёх треугольниках (в противном случае одно из оставшихся 9 чисел будет длиной катета в двух треугольниках с данной гипотенузой, а тогда эти треугольники будут равны по гипотенузе и катету). Аналогично второе по величине число может быть длиной гипотенузы не более чем в четырёх треугольниках, третье и четвёртое — в трёх, пятое и шестое — в двух, седьмое и восьмое — в одном. Итого, прекрасных троек может получиться не более 20.

Двадцать прекрасных троек найдётся, например, для следующего набора чисел: 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ..., $\sqrt{10}$.

Ответ. а) Да; б) нет; в) 20.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 17. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 произвольно делят на три непустые группы. Затем вычисляют значение среднего арифметического чисел в каждой из групп (для группы из единственного числа среднее арифметическое равно этому числу).

а) Могут ли получиться одинаковыми два из этих трёх значений средних арифметических в группах из разного количества чисел?

б) Могут ли получиться одинаковыми все три значения средних арифметических?

в) Найдите минимальное возможное значение максимального из получаемых средних арифметических.

Решение. а) Например, для групп $\{1, 4, 7\}$ и $\{2, 6\}$ средние значения совпадают и равны 4.

б) Предположим, что это возможно. Пусть все 3 средних значения равны s . В каждой группе от 1 до 8 натуральных чисел, поэтому соответствующее среднее представимо в виде $s = \frac{a}{b}$, где a — натуральное число и $b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. С другой стороны, пусть группы состоят из n , m и k чисел. Тогда суммы чисел в группах равны ns , ms и ks соответственно, а общая сумма всех 10 чисел равна 61 и равна $(n + m + k)s = 10s$. Поэтому $10s = 61$; $s = \frac{61}{10}$. Это противоречит тому, что знаменатель числа s не превосходит 8.

в) Пусть группы состоят из n , m и k чисел, а соответствующие средние значения равны c_1 , c_2 и c_3 . Если $c_1 < 6,1$, $c_2 < 6,1$, $c_3 < 6,1$, то

$$nc_1 + mc_2 + kc_3 < (n + m + k) \cdot 6,1 = 61,$$

что противоречит условию. Значит, хотя бы одно из чисел c_1 , c_2 , c_3 не меньше 6,1. Поэтому максимальное из этих чисел не меньше 6,1. При этом каждое из этих чисел имеет вид $s = \frac{a}{b}$, где a — натуральное число и $b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, поэтому максимальное из этих чисел не меньше $6\frac{1}{8}$.

Покажем, что максимальное из этих чисел не может равняться $6\frac{1}{8}$. Пусть $c_1 = 6\frac{1}{8}$. Тогда первая группа состоит из 8 чисел, сумма которых равна $6\frac{1}{8} \cdot 8 = 49 = 61 - 12$. Значит, каждая из других двух групп состоит из одного числа, причём сумма этих двух чисел равна 12. Но тогда одно из этих чисел больше 6, т. е. как минимум 7, поэтому максимальное среднее больше $6\frac{1}{8}$.

Таким образом, получаем, что максимальное из чисел c_1 , c_2 , c_3 не меньше $6\frac{1}{7}$.

Покажем, что максимальное из чисел c_1, c_2, c_3 может равняться $6\frac{1}{7}$. В самом деле, например, для разбиения на группы $\{6\}, \{4, 8\}, \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 16\}$ получаем $c_1 = c_2 = 6, c_3 = 6\frac{1}{7}$.

Ответ. а) Да; б) нет; в) $6\frac{1}{7}$.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 18. Бухгалтеру требуется выдать премии сотрудникам на общую сумму 600 000 рублей (размер премии каждого сотрудника — натуральное число, кратное 1000). Бухгалтеру дают распределение премий, и он должен их выдать без сдачи и размена, имея 100 купюр по 1000 рублей и 100 купюр по 5000 рублей.

а) Удастся ли выполнить задание, если в отделе 40 сотрудников и все должны получить поровну?

б) Удастся ли выполнить задание, если ведущему специалисту надо выдать 40 000 рублей, а остальное поделить поровну на 70 сотрудников?

в) При каком наибольшем количестве сотрудников задание удастся выполнить при любом распределении размеров премий (не исключено, что кому-то премии вообще не выписали)?

Решение. а) Каждый сотрудник должен получить $600\,000 : 40 = 15\,000$ рублей. Выдадим 33 сотрудникам по 3 пятитысячных купюры, одному — пятитысячную и 10 тысячных, шестерым — по 15 тысячных.

б) Каждый сотрудник, кроме ведущего специалиста, должен получить 8000 рублей, поэтому нужно будет выдать каждому не менее трёх тысячных купюр, значит, всего тысячных купюр нужно не менее 210 штук. Следовательно, без сдачи и размена выдать премии не удастся.

в) Если сотрудников 27 или больше, то распределим премии так: 26 человек должны получить по 4 тысячи, один — всё остальное,

остальные — ничего. Тогда выдать премии будет нельзя по тем же причинам, что и в пункте б).

Если же их не больше 26, то всем, кроме одного, будем выдавать их премии, используя не более 4 тысячных купюр (очевидно, это возможно: достаточно поделить размер премии на 5000 с остатком), пока не кончатся пятитысячные купюры.

Если пятитысячные купюры закончились, то оставшиеся премии выдать точно удастся. Если же нет, то все премии, кроме одной, будут выданы (поскольку их получают не более 25 человек, значит, израсходуется не более 100 купюр по 1000 рублей), а последний просто заберёт все оставшиеся деньги.

Ответ. а) Да; б) нет; в) 26.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 19. Вдоль окружности расставили натуральные числа от 1 до 21 (каждое число поставлено по одному разу) в произвольном порядке. Затем посчитали 21 число — разности между двумя соседними числами (из большего числа вычитается меньшее).

а) Могли ли все эти числа быть не меньше 10? Ответ обоснуйте.

б) Могли ли все эти числа быть не меньше 11? Ответ обоснуйте.

в) Посчитали все разности между соседними числами и между числами, стоящими через одно (из большего числа вычитается меньшее). Для какого наибольшего целого числа k можно так расставить числа, чтобы все эти разности были не меньше чем k (приведите пример расстановки для соответствующего числа k и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Решение. а) Да. Например, числа можно расставить так:

1, 12, 2, 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8, 19, 9, 20, 10, 21, 11

(и далее 1).

б) Нет. Так как чисел от 1 до 11 больше половины, при любой расстановке какие-то два из них будут стоять рядом. Их разность будет меньше 11.

в) Наибольшее значение k равно 6.

Приведем пример расстановки, где все разности не меньше 6.

1, 8, 15, 2, 9, 16, 3, 10, 17, 4, 11, 18, 5, 12, 19, 6, 13, 20, 7, 14, 21

(и далее 1).

Докажем, что не существует такой расстановки, где все разности не меньше 7. Предположим, что такая расстановка есть. Числа от 1 до 7 назовем особыми. Тогда особые числа не могут стоять рядом и не могут стоять через одно. Так как всего чисел 21, особые числа стоят через два. Но тогда для числа 8 места не осталось. В самом деле, или рядом с 8, или через одно число от 8 стоит особое число A , не равное 1. Но тогда разность $8 - A < 7$.

Ответ. а) Да; б) нет; в) 6.

Содержание критерия	Баллы
Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 20. Целое число S является суммой хотя бы трех последовательных членов непостоянной арифметической прогрессии, состоящей из целых чисел.

а) Может ли S равняться 8? Ответ обоснуйте.

б) Может ли S равняться 1? Ответ обоснуйте.

в) Найдите все значения, которые может принимать число S . Ответ обоснуйте.

Решение. а) Да. Например, $8 = -1 + 1 + 3 + 5$.

б) Нет. Запишем формулу суммы k членов арифметической прогрессии: $1 = \frac{k(2a_1 + d(k-1))}{2}$, т. е. $2 = k(2a_1 + d(k-1))$. Но по условию $k \geq 3$, и потому у числа 2 есть делитель, больший 2, — противоречие.

в) Все целые значения, кроме 1 и -1 .

Очевидно, S может быть равно 0.

Запишем S как сумму k членов арифметической прогрессии: $S = \frac{k(2a_1 + d(k-1))}{2}$, т. е. $2S = k(2a_1 + d(k-1))$. Для числа S , отличного от 0, 1 и -1 , можно положить $k = 2|S|$, $d = 1$, а тогда из уравнения $1 = 2a_1 + 2S - 1$ или $-1 = 2a_1 - 2S - 1$ получим $a_1 = 1 - S$ или $a_1 = S$ соответственно.

Невозможность равенства $S = 1$ доказана в предыдущем пункте, невозможность равенства $S = -1$ доказывается аналогично.

Ответ. а) Да; б) нет; в) все целые значения, кроме 1 и -1 .

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — обоснованно указаны числа, которые не могут быть значениями S ; — приведено доказательство того, что остальные числа могут быть значениями S	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 21. Целое число S является суммой хотя бы пяти последовательных членов непостоянной арифметической прогрессии, состоящей из целых чисел.

а) Может ли S равняться 9? Ответ обоснуйте.

б) Может ли S равняться 2? Ответ обоснуйте.

в) Найдите все значения, которые может принимать число S . Ответ обоснуйте.

Решение. а) Да. Например, $9 = -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4$.

б) Нет. Запишем формулу суммы k членов арифметической прогрессии: $2 = \frac{k(2a_1 + d(k-1))}{2}$, т. е. $4 = k(2a_1 + d(k-1))$. Но по условию $k \geq 5$, и потому у числа 4 есть делитель, больший 4, — противоречие.

в) Все целые значения, кроме 2, 1, -1 , -2 .

Очевидно, S может быть равно 0.

Запишем S как сумму k членов арифметической прогрессии: $S = \frac{k(2a_1 + d(k-1))}{2}$, т. е. $2S = k(2a_1 + d(k-1))$. Для числа S , отличного от 0, 1, 2, -1 и -2 , можно положить $k = 2|S|$, $d = 1$, а тогда из

уравнения $1 = 2a_1 + 2S - 1$ или $-1 = 2a_1 - 2S - 1$ получим $a_1 = 1 - S$ или $a_1 = S$ соответственно.

Невозможность равенства $S = 2$ доказана в предыдущем пункте, невозможность равенств $S = 1, -1, -2$ доказывается аналогично.

Ответ. а) Да; б) нет; в) все целые значения, кроме 2, 1, $-1, -2$.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — обоснованно указаны числа, которые не могут быть значениями S ; — приведено доказательство того, что остальные числа могут быть значениями S	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 22. Выступление спортсмена оценивают 7 судей, каждый судья выставляет оценку — целое число баллов от 0 включительно до 10 включительно. Известно, что все судьи выставили различные оценки. Результат спортсмена по старой системе оценивания — это среднее арифметическое семи оценок судей. Обозначим этот результат через A . Результат спортсмена по новой системе оценивания получается так: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки, и считается среднее арифметическое оставшихся пяти оценок. Обозначим этот результат через B .

а) Может ли $A - B$ равняться $\frac{1}{45}$? Ответ обоснуйте.

б) Может ли $A - B$ равняться $\frac{1}{35}$? Ответ обоснуйте.

в) Найдите наибольшее возможное значение числа $A - B$ (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получить не могло).

Решение. а) Не может. В самом деле, $A = \frac{m}{7}$, $B = \frac{n}{5}$, где m и n — целые числа. Поэтому если $A - B > 0$, то $A - B = \frac{m}{7} - \frac{n}{5} = \frac{5m - 7n}{35} \geq \frac{1}{35}$.

б) Да, может. Например, судьи могли выставить такие оценки: 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9. Возможны и другие примеры.

в) Пусть x — наименьшая из семи оценок, z — наибольшая, Y — сумма остальных пяти оценок.

Тогда

$$\begin{aligned} A - B &= \frac{x+Y+z}{7} - \frac{Y}{5} = \frac{5x - 2Y + 5z}{35} \leq \\ &\leq \frac{5x - 2(x+1+x+2+x+3+x+4+x+5) + 5z}{35} = \\ &= \frac{5z - 5x - 30}{35} \leq \frac{5 \cdot 10 - 5 \cdot 0 - 30}{35} = \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

Число $A - B$ действительно может равняться $\frac{4}{7}$, если судьи выставили оценки 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10.

Ответ. 1) Нет; 2) да; 3) $\frac{4}{7}$.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 23. Из первых 30 нечётных чисел 1, 3, 5, ..., 59 выбрали 7 различных чисел, которые записали в порядке возрастания. Пусть A — четвёртое по величине среди этих чисел, а B — среднее арифметическое выбранных семи чисел.

а) Может ли $B - A$ равняться $\frac{1}{7}$? Ответ обоснуйте.

б) Может ли $B - A$ равняться $\frac{2}{7}$? Ответ обоснуйте.

в) Найдите наибольшее возможное значение числа $B - A$ (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получить не могло).

Решение. а) Нет, не может. В самом деле, пусть выбраны числа $a_1 < a_2 < \dots < a_7$. Тогда

$$B - A = \frac{a_1 + a_2 + a_3 - 6a_4 + a_5 + a_6 + a_7}{7}.$$

Числитель этой дроби — чётное число, и поэтому он не может равняться 1.

б) Да, может. Например, пусть выбраны числа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15. Возможны и другие примеры.

в) Представим выбранные числа в виде

$$A - c_1, A - c_2, A - c_3, A, A + d_1, A + d_2, A + d_3,$$

где $c_1 > c_2 > c_3 > 0$ и $0 < d_1 < d_2 < d_3$. Тогда

$$B - A = \frac{(d_1 + d_2 + d_3) - (c_1 + c_2 + c_3)}{7}.$$

Заметим, что числа $c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, d_3$ чётные, поэтому $c_1 + c_2 + c_3 \geq 2 + 4 + 6$, а так как $a_4 \geq 7$, получаем, что $d_1 + d_2 + d_3 \leq 48 + 50 + 52$. Поэтому

$$B - A = \frac{(d_1 + d_2 + d_3) - (c_1 + c_2 + c_3)}{7} \leq \frac{(48 + 50 + 52) - (2 + 4 + 6)}{7} = \frac{138}{7}.$$

Ответ. а) Нет; б) да; в) $\frac{138}{7}$.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 24. Участники голосования на сайте выбирают лучшего футболиста (каждый голосует лишь за одного футболиста). На сайте отображается рейтинг каждого футболиста — доля голосов, поданных за него, в процентах, округлённая до ближайшего целого числа (например, 10,3%, 11,5% и 12,7% округляются до 10, 12 и 13 соответственно).

а) Всего было подано 13 голосов. Могло ли быть так, что рейтинг футболиста Иванова равен 29? Ответ обоснуйте.

б) Пусть посетители сайта отдавали голоса за трех футболистов, каждый за одного. Могла ли сумма рейтингов быть больше 100? Ответ обоснуйте.

в) На сайте отображалось, что рейтинг футболиста Петрова равен 7. Это число не изменилось и после того, как Вася отдал свой голос за Петрова. При каком наименьшем числе отданных за всех футбо-

листов голосов, включая и Васин голос, такое возможно (приведите соответствующий пример и докажите, что меньшее число получиться не могло)?

Решение. а) Нет. Доля голосов, поданных за футболиста Иванова, равна $\frac{k}{13}$, где k — целое число от 0 до 13 включительно. Если на сайте отобразился рейтинг 29, то точная доля поданных за Иванова голосов лежит в пределах от 0,285 до 0,295. Тогда количество голосов, поданных за Иванова, может быть от $0,285 \cdot 13$ до $0,295 \cdot 13$, т. е. от 3,705 до 3,835. Но в указанном промежутке целых чисел нет.

б) Могла. Пусть было 7 голосов, распределенных как $2+2+3$. Так как $\frac{2}{7} = 0,285\dots$ и $\frac{3}{7} = 0,428\dots$, сумма рейтингов равна $29 + 29 + 43 = 101$.

в) Пусть всего было N голосов, включая Васин, а за футболиста Петрова было подано k голосов, включая Васин. По условию $\frac{6,5}{100} \leq \frac{k-1}{N-1} < \frac{7,5}{100}$ и $\frac{6,5}{100} \leq \frac{k}{N} < \frac{7,5}{100}$. Из первого неравенства получаем $13N + 187 \leq 200k < 15N + 185$, а из второго следует, что $13N \leq 200k < 15N$. Из написанных неравенств вытекает, что

$$13N + 187 \leq 200k < 15N, \quad (1)$$

а тогда из неравенства $13N + 187 < 15N$ получаем $N \geq 94$.

Пусть $N = 94 + x$, где x — целое неотрицательное число. Подставляя это выражение в неравенство (1), получаем $1409 + 13x \leq 200k < 1410 + 15x$. Из левого неравенства следует, что $k \geq 8$, а тогда из правого неравенства находим $15x > 1600 - 1410$, т. е. $x \geq 13$. Итак, $N \geq 94 + 13 = 107$.

Осталось привести пример, показывающий, что случай $N = 107$ возможен. Положим $k = 8$. Тогда $\frac{k-1}{N-1} = \frac{7}{106} = 0,066\dots$, а $\frac{k}{N} = \frac{8}{107} = 0,074\dots$

Ответ. а) Нет; б) да; в) 107.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 25. Даны 10 натуральных чисел, среди которых нет одинаковых. Известно, что сумма любых двух из этих чисел меньше суммы любых трех из этих 10 чисел.

а) Может ли одним из этих чисел быть число 1 000 000? Ответ обоснуйте.

б) Может ли одним из этих чисел быть число 14? Ответ обоснуйте

в) Какое минимальное значение может принимать сумма 10 данных чисел (приведите соответствующий пример и докажите, что сумма не может быть меньше)?

Решение. а) Да. Например, 1 000 000, 1 000 001, ..., 1 000 009.

б) Нет. Пусть число 14 есть среди данных 10 чисел. Выберем два наименьших и два наибольших числа из чисел, не равных 14. Тогда сумма наименьших как минимум на 14 меньше суммы наибольших (так как между наибольшим и предпоследним и между вторым по величине и последним числами находятся еще по 6 натуральных чисел). Добавив к выбранным двум наименьшим числам число 14, получаем противоречие с условием.

в) 195. Условие задачи равносильно тому, что сумма трех минимальных чисел больше суммы двух максимальных чисел. Упорядочим наши числа по возрастанию. Пусть наименьшее число равно n , следующее равно $n + a_1$, затем $n + a_1 + a_2$ и т. д., десятое число равно $n + a_1 + a_2 + \dots + a_9$. Отметим, что каждое из чисел a_1, \dots, a_9 не меньше 1. По условию

$$n + (n + a_1) + (n + a_1 + a_2) >$$

$$> (n + a_1 + a_2 + \dots + a_8) + (n + a_1 + a_2 + \dots + a_8 + a_9),$$

а значит, $n > a_2 + 2(a_3 + a_4 + \dots + a_8) + a_9 \geq 14$. Итак, $n \geq 15$. Набор чисел 15, 16, ..., 24, удовлетворяющий условию, очевидно, дает наименьшую сумму, равную 195.

Ответ. а) Да; б) нет; в) 195.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 26. Участники голосования на сайте выбирают лучшего футболиста (каждый голосует лишь за одного футболиста). На сайте отображается рейтинг каждого футболиста — доля голосов, поданных за него, в процентах, округленная до ближайшего целого числа (например, 10,3%, 11,5% и 12,7% округляются до 10, 12 и 13 соответственно).

а) Всего было подано 13 голосов, и рейтинг футболиста Иванова был равен 31. Увидев это, Вася отдал свой голос за Иванова. Чему теперь стал равен рейтинг футболиста Иванова?

б) Пусть посетители сайта отдавали голоса за двух футболистов, каждый за одного. Может ли сумма рейтингов футболистов быть больше 100?

в) На сайте отображалось, что футболист Петров имеет рейтинг 7. После того как Вася отдал свой голос за Петрова, на сайте стало отображаться, что рейтинг Петрова равен 9. При каком наибольшем числе отданных за всех футболистов голосов, включая и Васин голос, такое возможно (приведите соответствующий пример и докажите, что большего числа голосов быть не могло)?

Решение. а) 36. Доля голосов, поданных за футболиста Иванова, равна $\frac{k}{13}$, где k — целое число от 0 до 13 включительно. Если рейтинг Иванова равен 31, то доля поданных за Иванова голосов лежит в пределах от 0,305 до 0,315. Тогда количество голосов, поданных за Иванова, может составлять от $0,305 \cdot 13$ до $0,315 \cdot 13$, т. е. от 3,965 до 4,095. Но в указанном промежутке только одно целое число — число 4. Значит, за Иванова было подано 4 голоса из 13. После Васиного голосования за Иванова оказались поданными 5 голосов из 14, и, так как $\frac{5}{14} = 0,357\dots$, рейтинг Иванова составляет 36.

б) Да. Например, пусть было 200 голосов, распределенных как $99 + 101$. Так как $\frac{99}{200} = 0,495$ и $\frac{101}{200} = 0,505$, сумма рейтингов равна $50 + 51 = 101$.

в) Пусть всего было N голосов, включая Васин, а за футболиста Петрова было подано k голосов, включая Васин. По условию $\frac{6,5}{100} \leq \frac{k-1}{N-1} < \frac{7,5}{100}$ и $\frac{8,5}{100} \leq \frac{k}{N} < \frac{9,5}{100}$. Из первого неравенства получаем $13N + 187 \leq 200k < 15N + 185$, а из второго следует, что $17N \leq 200k < 19N$. Из написанных неравенств получаем

$$17N \leq 200k < 15N + 185, \quad (1)$$

а тогда из неравенства $17N < 15N + 185$ получаем $N \leq 92$.

Пусть $N = 92 - l$, где l — целое неотрицательное число. Подставляя это выражение в неравенство (1), получаем

$$17(92 - l) \leq 200k < 15(92 - l) + 185,$$

т. е. $1564 - 17l \leq 200k < 1565 - 15l$. Из правого неравенства следует, что $k \leq 7$, а тогда из левого неравенства получаем $17l \geq 1564 - 1400$, т. е. $l \geq 10$. Итак, $N \leq 92 - 10 = 82$.

Осталось привести пример, показывающий, что случай $N = 82$ возможен. Положим $k = 7$. Тогда $\frac{k-1}{N-1} = \frac{6}{81} = 0,074\dots$, а $\frac{k}{N} = \frac{7}{82} = 0,085\dots$

Ответ. а) 36; б) может; в) 82.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 27. Участники голосования на сайте выбирают лучшего футболиста из 146 кандидатов (каждый голосует лишь за одного футболиста). На сайте отображается рейтинг каждого футболиста — доля голосов, поданных за него, в процентах, округленная до ближайшего целого числа (например, 10,3%, 11,5% и 12,7% округляются до 10, 12 и 13 соответственно).

а) Всего было подано 13 голосов, и рейтинг футболиста Иванова был равен 31. Увидев это, Вася отдал свой голос за Петрова. Чему теперь стал равен рейтинг футболиста Иванова?

б) Вася проголосовал за футболиста Петрова. Могла ли от этого сумма рейтингов всех футболистов уменьшиться хотя бы на 30?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма рейтингов всех футболистов (приведите соответствующий пример распределения голосов и докажите, что большее число получиться не могло)?

Решение. а) 29. Доля голосов, поданных за футболиста Иванова, равна $\frac{k}{13}$, где k — целое число от 0 до 13 включительно. Если рейтинг Иванова равен 31, то точная доля поданных за Иванова голосов лежит

в пределах от 0,305 до 0,315. Тогда количество голосов, поданных за Иванова, может составлять от $0,305 \cdot 13$ до $0,315 \cdot 13$, т. е. от 3,965 до 4,095. Но в указанном промежутке только одно целое число — число 4. Значит, за Иванова было подано 4 голоса из 13. После Васиного голосования за Иванова оказались поданными 4 голоса из 14, и, так как

$$\frac{4}{14} = 0,285\dots,$$

рейтинг Иванова составляет 29.

б) Могла. Пусть было подано 200 голосов — по одному за всех, кроме Петрова, и 55 за Петрова. Тогда рейтинг всех, кроме Петрова, был равен 1, а рейтинг Петрова — 28 (сумма рейтингов равна 173). После Васиного голоса рейтинг Петрова по-прежнему равен 28 ($\frac{56}{201} = 0,278\dots$), а рейтинг остальных равен нулю (сумма рейтингов равна 28).

в) 173. Пример — изначальное распределение голосов в пункте б. Докажем, что больше получиться не могло. Заметим, что у каждого футболиста разность между округленным числом процентов и настоящим составляет не более 0,5. Поэтому при сложении рейтингов получится не более чем

$$100 \left(\begin{array}{c} \text{реальные проценты} \\ \text{всех футболистов} \end{array} \right) + 146 \cdot 0,5 \left(\begin{array}{c} \text{ошибки} \\ \text{округления} \end{array} \right) = 173.$$

Ответ. а) 29; б) да; в) 173.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 28. Даны 14 попарно различных натуральных чисел, причем сумма любых трех меньше суммы любых пяти.

а) Может ли одним из этих чисел быть 1 000 000? Ответ обоснуйте.

б) Могут ли среди этих чисел быть одновременно 13 и 14? Ответ обоснуйте.

в) Какое наименьшее значение может принимать сумма всех этих чисел (приведите соответствующий пример и докажите, что сумма не может быть меньше)?

Решение. а) Да. Например, 1 000 000, 1 000 001, ..., 1 000 013.

б) Нет. Пусть числа 13 и 14 одновременно присутствуют в наборе. Выберем три наименьших и три наибольших числа из чисел, отличных от 13 и 14, тогда сумма наименьших как минимум на 27 меньше суммы наибольших (поскольку, например, между наибольшим числом и третьим с конца находятся 8 натуральных чисел). Добавив к трем наименьшим числам 13 и 14, получим противоречие с условием.

в) 286. Упорядочим наши числа. Условие задачи равносильно тому, что сумма пяти минимальных чисел больше суммы трех максимальных. Пусть наименьшее число равно n , следующее равно $n + a_1$, затем $n + a_1 + a_2$ и т. д., четырнадцатое число равно $n + a_1 + a_2 + \dots + a_{13}$. Отметим, что каждое из чисел a_1, \dots, a_{13} не меньше 1. По условию

$$\begin{aligned} n + (n + a_1) + (n + a_1 + a_2) + (n + a_1 + a_2 + a_3) + (n + a_1 + a_2 + a_3 + a_4) > \\ > (n + a_1 + a_2 + \dots + a_{11}) + (n + a_1 + a_2 + \dots + a_{11} + a_{12}) + \\ + (n + a_1 + a_2 + \dots + a_{11} + a_{12} + a_{13}), \end{aligned}$$

откуда следует, что

$$2n + a_1 > 3(a_5 + \dots + a_{11}) + 2a_{12} + a_{13} + 2a_4 + a_3 \geq 27.$$

Таким образом, сумма двух наименьших чисел не меньше 28, поэтому одно из двух наименьших чисел не меньше 15. Тогда сумма остальных 12 чисел не меньше чем $16 + 17 + \dots + 27 = 258$, а сумма всех 14 чисел не меньше чем $258 + 28 = 286$. Набор чисел 13, 15, 16, 17, ..., 27, удовлетворяющих условию, дает сумму 286.

Ответ. а) Да; б) нет; в) 286.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 29. а) Можно ли представить число 2014 в виде суммы двух различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр? Ответ обоснуйте.

б) Можно ли представить число 199 в виде суммы двух различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр? Ответ обоснуйте.

в) Найдите наименьшее натуральное число, которое можно представить в виде суммы пяти попарно различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр (приведите соответствующий пример и докажите, что все меньшие числа представить нельзя)?

Решение. а) Да. Например, $2006 + 8 = 2014$. Возможны и другие примеры.

б) Нет. Если сумма двух чисел равна 199, то при их сложении «в столбик» не происходит переносов. Значит, две одинаковые суммы цифр первого и второго слагаемых вместе дают сумму цифр числа 199, т. е. 19, что невозможно.

в) Выпишем минимальные числа с каждой суммой цифр.

Сумма цифр 1: $1 + 10 + 100 + 1000 + 10\,000$.

Сумма цифр 2: $2 + 11 + 20 + 101 + 110$.

Сумма цифр 3: $3 + 12 + 21 + 30 + 102$.

Сумма цифр 4: $110 = 4 + 13 + 22 + 31 + 40$.

Если же сумма цифр как минимум 5, то среди наших чисел найдется число с тремя или более цифрами (и тогда сумма не меньше $100 + 4 \cdot 5$) либо 4 двузначных числа. В этом случае ни у каких двух не могут совпадать первые либо вторые цифры. Поэтому сумма всех не меньше чем

$$5 + (1 + 2 + 3 + 4) \cdot 10 + (0 + 1 + 2 + 3) = 111.$$

Ответ. а) Да; б) нет; в) 110.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	
	4

Пример 30. Пять различных натуральных чисел таковы, что никакие два не имеют общего делителя, большего 1.

а) Может ли сумма всех 5 чисел быть равна 26? Ответ обоснуйте.

б) Может ли сумма всех 5 чисел быть равна 23? Ответ обоснуйте.

в) Каково минимальное значение, которое может принимать сумма всех 5 чисел (приведите соответствующий пример и докажите, что сумма не может быть меньше)?

Решение. а) Да. Например, $26 = 1 + 4 + 5 + 7 + 9$.

б) Нет. Среди данных чисел не может быть больше одного четного. Если четное ровно одно, то сумма всех чисел будет четной. Если все числа нечетны, то их сумма не меньше

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25.$$

в) Если вместо одного числа взять 1, а вместо каждого из оставшихся четырех чисел взять его наименьший простой делитель, то полученные 5 чисел будут удовлетворять условию задачи, а их сумма будет не превосходить сумму исходных чисел. Поэтому наименьшая сумма — это сумма числа 1 и четырех наименьших простых чисел: $1 + 2 + 3 + 5 + 7 = 18$.

Ответ. а) Да; б) нет; в) 18.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 31. В некоторой компании поровну юношей и девушек. Юноши отправляли электронные письма девушкам. Каждый юноша отправил или 3 письма, или 16 писем, причем и тех и других юношей было не менее двух. Возможно, что какой-то юноша отправил какой-то девушке несколько писем.

а) Могло ли оказаться так, что каждая девушка получила по 6 писем? Ответ обоснуйте.

б) Все девушки получили поровну писем. Сколько могло быть девушек, если известно, что их было меньше 20? Найдите все возможные варианты ответа, обоснуйте их и докажите, что других вариантов нет.

в) Пусть все девушки получили различное число писем (возможно, какая-то девушка получила 0 писем). Каково наибольшее возможное количество девушек в такой компании (приведите соответствующий пример и докажите, что большего количества быть не могло)?

Решение. а) Да. Пусть было 13 юношей и 13 девушек, 10 юношей отправили по 3 письма и 3 юноши отправили по 16 писем. Очевидно, что эти 78 писем можно распределить по 6 между 13 девушками.

б) Пусть в компании было n юношей и n девушек, каждая девушка получила по b писем, отправили по 3 письма a юношей и отправили по 16 писем $n - a$ юношей. Тогда $3a + 16(n - a) = bn$, т. е. $(16 - b)n = 13a$. Следовательно, n делится на 13 (так как если $16 - b = 13$, то $n = a$, а если $16 - b = 0$, то $a = 0$, что невозможно по условию), поэтому $n = 13$; 13 девушек могло быть, пример приведен в предыдущем пункте.

в) Пусть в компании было n юношей и n девушек, отправили по 3 письма a юношей и отправили по 16 писем $n - a$ юношей. Тогда число отправленных писем равно $3a + 16(n - a)$, а число полученных писем не меньше чем

$$0 + 1 + \dots + (n - 1) = \frac{n(n - 1)}{2}.$$

Так как число отправленных писем равно числу полученных, получаем, что

$$3a + 16(n - a) \geq \frac{n(n - 1)}{2},$$

следовательно, $16n > \frac{n(n - 1)}{2}$, а значит, $n < 33$.

Значение $n = 32$ не подходит. В самом деле, из неравенства

$$3a + 16(n - a) \geq \frac{n(n - 1)}{2}$$

при $n = 32$ получаем $512 - 13a \geq 496$, следовательно, $13a \leq 16$, что противоречит условию $a \geq 2$.

Значение $n = 31$ подходит, что показывает следующий пример. Пусть $a = 2$, $n - a = 29$, тогда число отправленных писем равно $3 \cdot 2 + 16 \cdot 29 = 470$. Число 470 можно представить в виде суммы 31 различного неотрицательного целого числа многими способами, например, так:

$$470 = 0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 29 + 35.$$

Это будут количества писем, полученных девушками.

Ответ. а) Да; б) 13; в) 31.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 32. В парке n аттракционов. С 10 до 11 часов утра парк посетили ровно n детей. Стоимость одного посещения каждого аттракциона составляет 10 рублей. Каждый ребенок потратил или 30, или 160 рублей, причем не все дети потратили поровну денег (один аттракцион можно посетить несколько раз).

а) Могла ли выручка каждого аттракциона составить ровно 60 рублей? Ответ обоснуйте.

б) Все аттракционы получили одинаковую выручку. Сколько было детей, если их количество было меньше 20? Ответ обоснуйте.

в) Пусть любые два аттракциона имеют разную выручку (возможно, нулевую). Каково наибольшее возможное количество посетивших парк детей (приведите соответствующий пример и докажите, что больше детей быть не могло)?

Решение. а) Да. Пусть было 13 детей и 13 аттракционов, 10 детей потратили по 30 рублей, а 3 ребенка потратили по 160 рублей. Очевидно, что потраченные 780 рублей можно распределить так, чтобы каждый из 13 аттракционов заработал ровно 60 рублей.

б) Пусть было n детей и n аттракционов, каждый аттракцион заработал $10b$ рублей, a детей истратили по 30 рублей и $n - a$ детей истратили по 160 рублей. Тогда $30a + 160(n - a) = 10bn$, а значит, $(16 - b)n = 13a$. Следовательно, n делится на 13 (так как если $16 - b = 13$, то $n = a$, а если $16 - b = 0$, то $a = 0$, что невозможно по условию), поэтому $n = 13$; 13 аттракционов могло быть, пример приведен в предыдущем пункте.

в) Пусть было n детей и n аттракционов, a детей истратили по 30 рублей и $n - a$ детей истратили по 160 рублей. Тогда дети истратили $30a + 160(n - a)$ рублей. С другой стороны, аттракционы выручили

не меньше чем

$$0 + 10 + \dots + 10(n-1) = \frac{10n(n-1)}{2}.$$

Так как суммарная выручка равна сумме денег, потраченных детьми, получаем, что

$$30a + 160(n-a) \geq \frac{10n(n-1)}{2},$$

следовательно, $16n > \frac{n(n-1)}{2}$, а значит, $n < 33$.

Значение $n = 32$ подходит. В самом деле, из неравенства

$$3a + 16(n-a) \geq \frac{n(n-1)}{2}$$

при $n = 32$ получаем $512 - 13a \geq 496$, т. е. $13a \leq 16$, тогда $a = 1$, следовательно, $n - a = 31$, и потраченная сумма денег равна

$$1 \cdot 30 + 31 \cdot 160 = 4990.$$

Это число может быть получено как

$$4990 = 0 + 10 + \dots + 290 + 300 + 340$$

(есть и другие варианты).

Ответ. а) Да; б) 13; в) 32.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 33. Десятичная запись натурального числа A оканчивается на одиннадцать цифр 8 и состоит не только из цифр 8, а десятичная запись числа B оканчивается на одиннадцать цифр 1 и состоит не только из цифр 1.

а) Может ли выполняться равенство $14A - 13B = 3$? Ответ обоснуйте.

б) Может ли число A нацело делиться на число B ? Ответ обоснуйте.

в) Каково наименьшее значение выражения $|14A - 13B|$ (необходимо найти это значение и доказать, что меньших не бывает)?

Решение. а) Нет. Последняя цифра числа $14A$ — это 2, а последняя цифра числа $13B$ — это 3. Значит, последней цифрой числа $14A - 13B$ будет либо 9, если это число положительно, либо 1, если это число отрицательно.

б) Да. Например, $1\ 688\ 888\ 888\ 888 = 8 \cdot 211\ 111\ 111\ 111$.

в) Пусть $A = a88\ 888\ 888\ 888$, $B = b11\ 111\ 111\ 111$ (здесь a и b — комбинации из одной или нескольких цифр). Тогда

$$A = a \cdot 10^{11} + \frac{8}{9} \cdot (10^{11} - 1), \quad B = b \cdot 10^{11} + \frac{1}{9} \cdot (10^{11} - 1).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} 14A - 13B &= (14a - 13b) \cdot 10^{11} + \frac{14 \cdot 8 - 13}{9} \cdot (10^{11} - 1) = \\ &= (14a - 13b + 11) \cdot 10^{11} - 11. \end{aligned}$$

Видим, что значение выражения $|14A - 13B|$ не может быть меньше 11 и что $|14A - 13B| = 11$ тогда и только тогда, когда $14a - 13b + 11 = 0$. Это возможно, например, при $a = 2$ и $b = 3$.

Ответ. а) Нет; б) да; в) 11.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Пример 34. Из первых 20 натуральных чисел $1, 2, 3, \dots, 20$ выбрали $2k$ различных чисел. Выбранные числа разбили на пары (a_1, b_1) , (a_2, b_2) , \dots , (a_k, b_k) и посчитали сумму чисел в каждой паре. Оказалось, что все полученные суммы $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_k + b_k$ различны и не превосходят 25.

а) Могло ли получиться так, что сумма всех выбранных $2k$ чисел равняется 150 и в каждой паре одно из чисел ровно в три раза больше другого? Ответ обоснуйте

б) Могло ли быть $k = 10$? Ответ обоснуйте.

в) Найдите наибольшее возможное значение числа k (приведите соответствующий пример и докажите, что бóльшие значения невозможны).

Решение. а) Нет. Из условия следует, что сумма чисел в каждой паре кратна 4. Поэтому сумма всех выбранных чисел должна быть кратна 4, а число 150 не кратно 4.

б) Нет. Пусть $k = 10$. Значит, выбраны все 20 чисел.

Сумма всех чисел от 1 до 20 равна 210. С другой стороны, эта сумма равна $(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_{10} + b_{10})$. Так как суммы чисел в парах различны и не превосходят 25, наибольшее возможное значение суммы $(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_{10} + b_{10})$ равно $25 + 24 + 23 + \dots + 16 = 205$ — противоречие.

в) Обозначим $S = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_k + b_k)$. Из условия следует, что $1 + 2 + \dots + 2k \leq S \leq 25 + 24 + \dots + (26 - k)$, откуда, просуммировав арифметические прогрессии, получаем неравенство $\frac{2k(2k+1)}{2} \leq \frac{k(51-k)}{2}$. Решая это неравенство, получаем $k \leq 9$. Выбрать 9 пар можно: (20, 5); (19, 4); (18, 6); (17, 3); (16, 2); (15, 7); (14, 1); (13, 8); (10, 9).

Ответ. а) Нет; б) нет; в) 9.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

§ 9. Тренажёр. Многопунктовые задачи

А теперь, после повторения теории, изучения основных методов решения задач и знакомства с задачами экзаменов прошлых лет, критериями оценки решений и тем, за что даются баллы, вы можете проверить свои силы на тренировочных задачах этого параграфа. Помните, что даже частичное решение, ответ, построение примера и контр-примера или другие разумные соображения могут принести вам вожаделенные баллы. Если не удалось решить задачу полностью — попробуйте решить хотя бы один из пунктов.

Каждый пункт — это по сути отдельная задача, и методы их решения могут существенно отличаться. Не обязательно решать их подряд — иногда последующие пункты могут оказаться проще и понятнее, чем первый.

К задачам приведены краткие пояснения, подсказки, ответы, краткие или полные решения. Не торопитесь сразу читать их, попытайтесь решить задачу самостоятельно. Прочтя ответ, постарайтесь использовать его для поиска решения. А читая краткие решения, восстанавливайте все пропущенные детали доказательств, пытайтесь понять, что именно в условиях задач должно было натолкнуть нас на ключевые идеи. В некоторых задачах мы будем варьировать условие, чтобы вы лучше поняли, как решать не только *эту*, но и *такие* задачи. В этом и состоит одна из функций тренажера.

Итак, вперед!

1. На 8 карточках написаны 8 различных цифр. Вася составляет из них 4 двузначных числа и складывает их.

а) Чему может быть равна максимальная сумма?

Ответ. $95 + 84 + 73 + 62 = 314$.

б) Докажите, что среди сумм есть две одинаковые.

Намёк. Переставим первые цифры в двух числах...

в) Докажите, что среди сумм есть как минимум 90 одинаковых.

Подсказка. Перестановками цифр сделаем 24 одинаковые суммы. Суммы могут принимать значения от

$$15 + 26 + 37 + 40 = 118$$

до 314, причем все они имеют одинаковый остаток от деления на 9, поэтому будет не более чем $(314 - 118) : 9 + 1$, т. е. не более 22 вариантов.

2. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, кратных 45, чтобы первое из них было четырёхзначным, второе — трёх-

значным и в их десятичных записях каждая из цифр 0, 1, 3, 4, 5, 6 и 8 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 3645; 180. Возможны другие варианты.

б) 36 пар.

в) $9045 = 8415 + 630$.

Эта задача заметно труднее первой, поэтому приведем более подробное решение.

Решение. а) 3645; 180. Возможны и другие варианты.

б) Заметим, что число будет кратно 45 тогда и только тогда, когда оно будет кратно 5 и 9. Так как оба числа должны быть кратны 5, одно из них должно оканчиваться на 5, а другое — на 0.

Найдём количество пар искомым чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 5. Для того чтобы это число было кратно 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была кратна 9. Это возможно лишь в том случае, когда сумма первых двух его цифр равна 4 или 13. Никакие две не равные 0 или 5 цифры из данного в условии задачи набора не дают в сумме 13. Значит, сумма первых двух цифр равна 4. Возможны лишь два таких трёхзначных числа: 135 и 315. Заметим, что сумма оставшихся цифр равна 18. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае будет ровно 12 искомым пар.

Найдём количество пар искомым чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 0. Для того чтобы это число делилось на 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была равна 9. Значит, на первых двух местах этого числа может стоять одна из пар цифр: 1 и 8, 3 и 6. Есть ровно 4 варианта таких трёхзначных чисел. Заметим, что сумма всех оставшихся цифр равна 18. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае имеются 24 искомые пары.

Следовательно, всего существует 36 искомым пар.

в) Пусть \overline{abcd} и \overline{efg} — десятичные записи четырёхзначного и трёхзначного чисел, одно из которых заканчивается на 0, другое — на 5, а a, b, e, c, f — это цифры 1, 3, 4, 6 и 8, написанные в таком поряд-

ке, что сумма $\overline{abcd} + \overline{efg}$ принимает наибольшее возможное значение. Имеем $\overline{abcd} + \overline{efg} = 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$.

Если a не равно 8, то, поменяв местами цифры a и 8, мы увеличим сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$, что противоречит выбору порядка цифр. Аналогично если цифры b и e не являются взятыми в каком-то порядке цифрами 6 и 4, то сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$ можно увеличить, поменяв местами одну из цифр b или e с одной из цифр c или f , что противоречит выбору порядка цифр. Следовательно,

$$\begin{aligned} 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5 &= \\ &= 1000 \cdot 8 + 100 \cdot 6 + 100 \cdot 4 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 1 + 5 = 9045. \end{aligned}$$

Значит, никакая пара чисел из условия задачи не может давать в сумме число, большее 9045.

С другой стороны, пара чисел 8415 и 630 удовлетворяет условию задачи, а их сумма равна 9045. Поэтому 9045 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

Вот еще несколько очень похожих задач. Попробуйте, разобравшись с решением второй задачи, решить их самостоятельно, прежде чем читать ответ или решение.

3. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, кратных 45, чтобы первое из них было четырёхзначным, второе — трёхзначным и в их десятичных записях каждая из цифр 0, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 3645; 270. Возможны другие варианты.

б) 36 пар.

в) $8055 = 7425 + 630$.

Решение. а) 3645; 270. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что число будет кратно 45 тогда и только тогда, когда оно будет кратно 5 и 9. Так как оба числа должны быть кратны 5, одно из них должно оканчиваться на 5, а другое — на 0.

Найдём количество пар искомых чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 5. Для того чтобы это число было кратно 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была кратна 9. Это возможно лишь в том случае, когда сумма первых двух его цифр равна 4 или 13. Никакие две не равные 0 или 5 цифры из данного в условии задачи набора не дают в сумме 4. Значит, сумма первых

двух цифр равна 13. Возможны лишь два таких трёхзначных числа: 675 и 765. Заметим, что сумма оставшихся цифр равна 9. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае будет ровно 12 искомым пар.

Найдём количество пар искомым чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 0. Для того чтобы это число делилось на 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была равна 9. Значит, на первых двух местах этого числа может стоять одна из пар цифр: 2 и 7, 3 и 6. Есть ровно 4 варианта таких трёхзначных чисел. Заметим, что сумма всех оставшихся цифр равна 18. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае имеются 24 искомые пары.

Следовательно, всего существует 36 искомым пар.

в) Пусть \overline{abcd} и \overline{efg} — десятичные записи четырёхзначного и трёхзначного чисел, одно из которых заканчивается на 0, другое — на 5, а a, b, e, c, f — это цифры 2, 3, 4, 6 и 7, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcd} + \overline{efg}$ принимает наибольшее возможное значение. Имеем $\overline{abcd} + \overline{efg} = 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$.

Если a не равно 7, то, поменяв местами цифры a и 7, мы увеличим сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$, что противоречит выбору порядка цифр. Аналогично если цифры b и e не являются взятыми в каком-то порядке цифрами 6 и 4, то сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$ можно увеличить, поменяв местами одну из цифр b или e с одной из цифр c или f , что противоречит выбору порядка цифр. Следовательно,

$$\begin{aligned} 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5 &= \\ &= 1000 \cdot 7 + 100 \cdot 6 + 100 \cdot 4 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 5 = 8055. \end{aligned}$$

Значит, никакая пара чисел из условия задачи не может давать в сумме число, большее 8055.

С другой стороны, пара чисел 7425 и 630 удовлетворяет условию задачи, а их сумма равна 8055. Поэтому 8055 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

4. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, кратных 45, чтобы первое из них было четырёхзначным, второе — трёхзначным и в их десятичных записях каждая из цифр 0, 1, 2, 3, 5, 7 и 9 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 1935; 270. Возможны другие варианты.

б) 24 пары.

в) $10\,035 = 9315 + 720$.

Решение. а) 1935, 270. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что число будет кратно 45 тогда и только тогда, когда оно будет кратно 5 и 9. Так как оба числа должны быть кратны 5, одно из них должно оканчиваться на 5, а другое — на 0.

Найдём количество пар искомых чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 5. Для того чтобы это число было кратно 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была кратна 9. Это возможно лишь в том случае, когда сумма первых двух его цифр равна 4 или 13. Никакие две не равные 0 или 5 цифры из данного в условии задачи набора не дают в сумме 13. Значит, сумма первых двух цифр равна 4. Возможны лишь два таких трёхзначных числа: 135 и 315. Заметим, что сумма оставшихся цифр равна 18. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае будет ровно 12 искомых пар.

Найдём количество пар искомых чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 0. Для того чтобы это число делилось на 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была равна 9. Значит, на первых двух местах этого числа может стоять лишь пара цифр 2 и 7. Есть ровно 2 варианта таких трёхзначных чисел. Заметим, что сумма всех оставшихся цифр равна 18. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае будет 12 искомых пар.

Следовательно, всего существует 24 искомые пары.

в) Пусть \overline{abcd} и \overline{efg} — десятичные записи четырёхзначного и трёхзначного чисел, одно из которых заканчивается на 0, другое — на 5, а a, b, e, c, f — это цифры 1, 2, 3, 7 и 9, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcd} + \overline{efg}$ принимает наибольшее возможное значение. Имеем $\overline{abcd} + \overline{efg} = 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$.

Если a не равно 9, то, поменяв местами цифры a и 9, мы увеличим сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$, что про-

тиворечит выбору порядка цифр. Аналогично если цифры b и e не являются взятыми в каком-то порядке цифрами 7 и 3, то сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$ можно увеличить, поменяв местами одну из цифр b или e с одной из цифр c или f , что противоречит выбору порядка цифр. Следовательно,

$$\begin{aligned} 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5 &= \\ &= 1000 \cdot 9 + 100 \cdot 7 + 100 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 10 \cdot 1 + 5 = 10\,035. \end{aligned}$$

Значит, никакая пара чисел из условия задачи не может давать в сумме число, большее 10 035.

С другой стороны, пара чисел 9315 и 720 удовлетворяет условию задачи, а их сумма равна 10 035. Поэтому 10 035 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

5. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, кратных 45, чтобы первое из них было четырёхзначным, второе — трёхзначным и в их десятичных записях каждая из цифр 0, 1, 5, 6, 7, 8 и 9 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 6795; 180. Возможны другие варианты.

б) По-прежнему 24 пары.

в) $10\,575 = 9765 + 810$.

Решение. а) 6795; 180. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что число будет кратно 45 тогда и только тогда, когда оно будет кратно 5 и 9. Так как оба числа должны быть кратны 5, одно из них должно оканчиваться на 5, а другое — на 0.

Найдём количество пар искомым чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 5. Для того чтобы это число было кратно 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была кратна 9. Это возможно лишь в том случае, когда сумма первых двух его цифр равна 4 или 13. Никакие две не равные 0 или 5 цифры из данного в условии задачи набора не дают в сумме 4. Значит, сумма первых двух цифр равна 13. Возможны лишь два таких трёхзначных числа: 675 и 765. Заметим, что сумма оставшихся цифр равна 18. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае будет ровно 12 искомым пар.

Найдём количество пар искомых чисел, для которых трёхзначное число оканчивается на 0. Для того чтобы это число делилось на 9, необходимо и достаточно, чтобы сумма всех его цифр была равна 9. Значит, на первых двух местах этого числа может стоять лишь пара цифр 1 и 8. Есть ровно 2 таких трёхзначных числа. Заметим, что сумма всех оставшихся цифр равна 27. Следовательно, как бы ни были расставлены оставшиеся цифры в четырёхзначном числе, оно будет кратно 9. Существует ровно 6 способов расставить 3 ненулевые цифры на первых трёх местах четырёхзначного числа. Значит, в этом случае будет 12 искомых пар.

Следовательно, всего существует 24 искомые пары.

в) Пусть \overline{abcd} и \overline{efg} — десятичные записи четырёхзначного и трёхзначного чисел, одно из которых заканчивается на 0, другое — на 5, а a, b, e, c, f — это цифры 1, 6, 7, 8 и 9, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcd} + \overline{efg}$ принимает наибольшее возможное значение. Имеем

$$\overline{abcd} + \overline{efg} = 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5.$$

Если a не равно 9, то поменяв местами цифры a и 9, мы увеличим сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$, что противоречит выбору порядка цифр. Аналогично если цифры b и e не являются взятыми в каком-то порядке цифрами 7 и 8, то сумму $1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5$ можно увеличить, поменяв местами одну из цифр b или e с одной из цифр c или f , что противоречит выбору порядка цифр. Следовательно,

$$\begin{aligned} 1000 \cdot a + 100 \cdot b + 100 \cdot e + 10 \cdot c + 10 \cdot f + 5 &= \\ &= 1000 \cdot 9 + 100 \cdot 8 + 100 \cdot 7 + 10 \cdot 6 + 10 \cdot 1 + 5 = 10575. \end{aligned}$$

Значит, никакая пара чисел из условия задачи не может давать в сумме число, большее 10575.

С другой стороны, пара чисел 9765 и 810 удовлетворяет условию задачи, а их сумма равна 10575. Поэтому 10575 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

Надеемся, что на пути от второй до пятой задачи степень вашего личного вклада в решение возрастала. На это и рассчитан тренажёр. Мы сейчас не экзаменуемся, не соревнуемся, а учимся...

А теперь изменим сюжет.

6. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Попробовали решить? Если не получилось, то вы не слишком внимательно проработали предшествующую задачу. Поэтому сразу приведем полное решение.

Решение. а) 45 972; 36. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 2, 4, 5, 7 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 52, 72, 92 и 24. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 3, 4, 5, 6 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 36, 56, 96 и 64. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Всего существует 48 подходящих пар чисел.

в) Пара чисел 97 524 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 97 560.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, а второе кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное значение. Тогда $a = 9$, иначе сумма чисел в паре будет меньше чем

$$90\,000 + 100 = 90\,100 < 97\,560.$$

Если $b < 7$, то сумма чисел в паре будет меньше чем

$$96\,700 + 100 = 96\,800 < 97\,560.$$

Значит, $b = 7$. Тогда двузначное число в такой паре должно быть равно 36. Так как \overline{abcde} кратно 4, число с десятичной записью \overline{cde} также кратно 4, причём c, d и e — взятые в некотором порядке цифры 2, 4

и 5. Следовательно, cde не превосходит 524, а сумма

$$\overline{abcde} + \overline{fg} = 97 \cdot 1000 + \overline{cde} + 36$$

не превосходит $97\,000 + 524 + 36 = 97\,560$. Поэтому 97 560 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

7. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 18972; 36. Возможны другие варианты.

б) 48 пар.

в) $98\,748 = 98\,712 + 36$.

Решение. а) Как мы и писали в ответах: 18972; 36. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 1, 2, 7, 8 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 12, 72, 92 и 28. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 1, 3, 6, 8 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 16, 36, 96 и 68. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Всего существует 48 подходящих пар чисел.

в) Пара чисел 98 712 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 98 748.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, а второе кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9, написанные в таком

порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное значение. Тогда $a = 9$, иначе сумма чисел в паре будет меньше чем

$$90\,000 + 100 = 90\,100 < 98\,748.$$

Если $b < 8$, то сумма чисел в паре будет меньше чем

$$97\,800 + 100 = 97\,900 < 98\,748.$$

Значит, $b = 8$. Если двузначное число в такой паре равно 72, то число cde составлено из цифр 1, 3, 6 и кратно 4, т. е. $cde \leq 316$. Тогда

$$\overline{abcde} + \overline{fg} \leq 98\,316 + 72 = 98\,398 < 98\,748.$$

Следовательно, двузначное число в такой паре должно быть равно 36. Так как \overline{abcde} кратно 4, число с десятичной записью \overline{cde} также кратно 4, причём c , d и e — взятые в некотором порядке цифры 1, 2 и 7. Следовательно, cde равно 712 и пара чисел совпадает с приведённым примером. Поэтому 98 748 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

8. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 9 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 14936; 72. Возможны другие варианты.

б) 48 пар.

в) $97\,448 = 97\,412 + 36$.

Решение. а) 14936; 72. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 1, 2, 4, 7 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 12, 72, 92 и 24. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 1, 3, 4, 6 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 16, 36, 96 и 64. Приписать впереди три оставшиеся

цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Всего существует 48 подходящих пар чисел.

в) Пара чисел 97 412 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 97 448.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, а второе кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 9, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное значение. Тогда $a = 9$, иначе сумма чисел в паре будет меньше чем

$$90\,000 + 100 = 90\,100 < 97\,448.$$

Если $b < 7$, то сумма чисел в паре будет меньше чем

$$96\,800 + 100 = 96\,900 < 97\,448.$$

Значит, $b = 7$. Тогда двузначное число в такой паре равно 36. Так как \overline{abcde} кратно 4, число с десятичной записью \overline{cde} также кратно 4, причём c, d и e — взятые в некотором порядке цифры 1, 2 и 4. Следовательно, cde не превосходит 412 и

$$\overline{abcde} + \overline{fg} = 97\,000 + \overline{cde} + 36$$

не превосходит

$$97\,000 + 412 + 36 = 97\,448.$$

Поэтому 97 448 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

9. а) Приведите пример таких натуральных двух чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 58 936; 72. Возможны другие варианты.

б) 48 пар.

в) $98\,788 = 98\,752 + 36$.

Решение. а) 58 936, 72. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 2, 5, 7, 8 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 52, 72, 92 и 28. Приписать спереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 3, 5, 6, 8 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 36, 56, 96 и 68. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Всего существует 48 подходящих пар чисел.

в) Пара чисел 98 752 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 98 788.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, а второе кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное значение. Тогда $a = 9$, иначе сумма чисел в паре будет меньше чем

$$90\,000 + 100 = 90\,100 < 98\,788.$$

Если $b < 8$, то сумма чисел в паре будет меньше чем

$$98\,000 + 100 = 98\,100 < 98\,788.$$

Значит, $b = 8$. Если $c < 7$, то сумма чисел в паре будет меньше чем $98\,680 + 100 = 98\,780 < 98\,788$. Значит, $c = 7$. Тогда двузначное число в такой паре равно 36. Так как \overline{abcde} кратно 4, число с десятичной записью \overline{de} также кратно 4, причём d и e — взятые в некотором порядке цифры 5 и 2. Следовательно, $\overline{de} = 52$ и пара $\overline{abcde}, \overline{fg}$ совпадает с приведённым примером. Поэтому 98 788 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

10. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 14536; 72. Возможны другие варианты.

б) 48 пар.

в) $75\ 448 = 75\ 412 + 36$.

Решение. а) 14536; 72. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 1, 2, 4, 5 и 7. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 12, 52, 72 и 24. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 1, 3, 4, 5 и 6. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 16, 36, 56 и 64. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Всего существует 48 подходящих пар чисел.

в) Пара чисел 75 412 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 75 448.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, а второе кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное значение. Тогда $a = 7$, иначе сумма чисел в паре будет меньше чем

$$70\ 000 + 100 = 70\ 100 < 75\ 448.$$

Тогда двузначное число в такой паре равно 36. Если $b < 5$, то сумма чисел в паре будет меньше, чем

$$75\ 000 + 36 = 75\ 036 < 75\ 448.$$

Значит, $b = 5$. Так как \overline{abcde} кратно 4, число с десятичной записью \overline{cde} также кратно 4, причём c, d и e — взятые в некотором порядке цифры 1, 2 и 4. Следовательно, \overline{cde} не превосходит 412 и сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$

не превосходит

$$75\,412 + 36 = 75\,448.$$

Поэтому 75 448 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

11. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 15 836; 72. Возможны другие варианты.

б) 48 пар.

в) $87\,548 = 87\,512 + 36$.

Решение. а) 15 836; 72. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 1, 2, 5, 7 и 8. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 12, 52, 72 и 28. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 1, 3, 5, 6 и 8. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить четыре таких двузначных числа: 16, 36, 56 и 68. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 24 подходящие пары чисел.

Всего существует 48 подходящих пар чисел.

в) Пара чисел 87 512 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 87 548.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, второе — кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 1, 2, 3, 5, 6, 7, и 8, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное зна-

чение. Тогда $a = 8$, иначе сумма чисел в паре будет меньше чем

$$80\,000 + 100 = 80\,100 < 87\,548.$$

Если $b < 7$, то сумма чисел в паре будет меньше чем

$$86\,800 + 100 = 86\,900 < 87\,548.$$

Значит, $b = 7$. Тогда двузначное число в такой паре равно 36. Так как \overline{abcde} кратно 4, число c десятичной записью \overline{cde} также кратно 4, причём c , d и e — взятые в некотором порядке цифры 1, 2 и 5. Следовательно, \overline{cde} равно 512 и пара \overline{abcde} , \overline{fg} совпадает с приведённым примером. Поэтому 87548 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

12. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 48936; 72. Возможны другие варианты.

б) 72 пары.

в) $98\,760 = 98\,724 + 36$.

Решение. а) 48936, 72. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 2, 4, 7, 8 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить шесть таких двузначных чисел: 72, 92, 24, 84, 28 и 48. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 36 подходящих пар чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 3, 4, 6, 8 и 9. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить шесть таких двузначных чисел: 36, 96, 64, 84, 48 и 68. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 36 подходящих пар чисел.

Всего существует 72 подходящие пары чисел.

в) Пара чисел 98724 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 98760.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, а второе кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное значение. Тогда $a = 9$, иначе сумма чисел в паре будет меньше, чем

$$90\,000 + 100 = 90\,100 < 98\,760.$$

Если $b < 8$, то сумма чисел в паре будет меньше чем

$$98\,000 + 100 = 98\,100 < 98\,760.$$

Значит, $b = 8$. Если $c < 7$, то сумма чисел в паре будет меньше чем $98\,680 + 80 = 98\,760$. Значит, $c = 7$. Тогда двузначное число в такой паре равно 36. Так как \overline{abcde} кратно 4, число с десятичной записью \overline{de} также кратно 4, причём d и e — взятые в некотором порядке цифры 2 и 4. Следовательно, \overline{de} равно 24 и пара $\overline{abcde}, \overline{fg}$ совпадает с приведённым примером. Поэтому 98 760 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

13. а) Приведите пример таких двух натуральных чисел, чтобы первое из них было пятизначным и кратным 4, второе — двузначным и кратным 36 и в их десятичных записях каждая из цифр 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 встречалась ровно один раз.

б) Сколько существует различных пар таких чисел?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре (приведите соответствующий пример и докажите, что большее значение получиться не могло)?

Ответ. а) 14836; 72. Возможны другие варианты.

б) 72 пары.

в) $87\,448 = 87\,412 + 36$.

Решение. а) 14836; 72. Возможны другие варианты.

б) Заметим, что кратных 36 двузначных чисел всего два: 36 и 72.

Если двузначное число равно 36, то пятизначное число составлено из цифр 1, 2, 4, 7 и 8. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число, кратное 4. Из указанных цифр можно составить шесть таких двузначных чисел: 12, 52, 24, 84, 28 и 48. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 36 подходящих пар чисел.

Если двузначное число равно 72, то пятизначное число составлено из цифр 1, 3, 4, 6 и 8. Для того чтобы это число было кратным 4, нужно, чтобы две его последние цифры образовывали двузначное число,

кратное 4. Из указанных цифр можно составить шесть таких двузначных чисел: 16, 36, 64, 84, 48 и 68. Приписать впереди три оставшиеся цифры можно шестью различными способами. Значит, в этом случае существует ровно 36 подходящих пар чисел.

Всего существует 72 подходящие пары чисел.

в) Пара чисел 87 412 и 36 удовлетворяет условию задачи и даёт в сумме число 87 448.

Покажем, что это наибольшее возможное значение для суммы таких чисел.

Пусть \overline{abcde} и \overline{fg} — десятичные записи пятизначного и двузначного чисел, первое из которых кратно 4, а второе кратно 36, причём a, b, c, d, e, f и g — это цифры 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8, написанные в таком порядке, что сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ принимает наибольшее возможное значение. Тогда $a = 8$, иначе сумма чисел в паре будет меньше чем

$$80\,000 + 100 = 80\,100 < 87\,448.$$

Если $b < 7$, то сумма чисел в паре будет меньше чем

$$86\,800 + 100 = 86\,900.$$

Значит, $b = 7$. Тогда двузначное число в такой паре равно 36. Так как \overline{abcde} кратно 4, число с десятичной записью \overline{cde} также кратно 4, причём c, d и e — взятые в некотором порядке цифры 1, 2 и 4. Следовательно, \overline{cde} не превосходит 412, а сумма $\overline{abcde} + \overline{fg}$ не превосходит

$$87\,412 + 36 = 87\,448.$$

Поэтому 87 448 является наибольшим возможным значением для таких сумм.

Заодно, кроме тренировки, мы можем понять, как на основе близкого круга идей создаются задачи для разных вариантов экзамена. В подавляющем числе случаев они мало отличаются по трудности, и разговоры о том, что в одном и том же регионе варианты были совершенно разного уровня, — не более чем разговоры...

Теперь ещё несколько сюжетов на разные темы.

14. В школе было несколько классов, в каждом из которых количество мальчиков относилось к количеству девочек как 5 : 2 или 2 : 5. В школу приняли ещё 3 мальчика и 2 девочек.

а) Удастся ли теперь разбить всех учеников на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек равнялось 4 : 3 или 3 : 4?

б) Всех учеников удалось разбить на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек равнялось 5 : 3 или 3 : 5. Могло ли при этом получиться ровно 5 классов?

в) Всех учеников удалось разбить на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек равнялось $5 : 3$ или $3 : 5$. Было решено вывезти всех учеников на экскурсию группами по 56 человек, при этом одна из групп оказалась неполной. Сколько в этой группе было учеников?

Ответ. а) Нет; б) да; в) 40.

Решение. а) Нет. Если в классе $5n$ мальчиков и $2n$ девочек (или наоборот), то общее количество детей в каждом классе кратно 7. Поэтому и во всей школе количество учеников кратно 7. Аналогично и для классов с отношением $4 : 3$ и $3 : 4$ количество учеников в школе кратно 7. Но количество учеников школы изменилось на 5, и поэтому оно не могло остаться кратным 7.

б) Да. Допустим, что в школе было 2 класса с пятью мальчиками и двумя девочками и 3 класса с пятью девочками и двумя мальчиками. Добавляя в первые два класса по девочке, а в остальные по мальчику, получаем требуемое разбиение.

в) Аналогично п. а) получаем, что количество детей в школе кратно 8. Обозначим это количество через $8k$ и запишем k в виде $k = 7a + b$, где b — остаток от деления k на 7. Тогда $8(7a + b) - 5$ (старое число учеников) должно быть кратно 7, а значит, $8b - 5$ кратно 7, следовательно, $b = 5$.

Поэтому в школе $8(7a + 5) = 56a + 40$ учеников, значит, в неполной группе будет 40 человек.

15. В школе было несколько классов, в каждом из которых количество мальчиков относилось к количеству девочек как $7 : 2$ или $2 : 7$. В школу приняли еще 4 мальчиков и 3 девочек.

а) Удастся ли теперь разбить всех учеников на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек равнялось $5 : 4$ или $4 : 5$?

б) Всех учеников удалось разбить на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек равнялось $7 : 3$ или $3 : 7$. Могло ли при этом получиться ровно 7 классов?

в) Всех учеников удалось разбить на классы так, чтобы в каждом классе отношение количества мальчиков к количеству девочек равнялось $7 : 3$ или $3 : 7$. Было решено вывезти всех учеников на экскурсию группами по 90 человек, при этом одна из групп оказалась неполной. Сколько в этой группе было учеников?

Ответ. а) Нет; б) да; в) 70.

Решение. а) Нет. Если в классе $7n$ мальчиков и $2n$ девочек (или наоборот), то общее количество детей в каждом классе кратно 9. Поэтому и во всей школе количество учеников кратно 9. Аналогично

и для классов с отношением $5:4$ и $4:5$ количество учеников в школе кратно 9. Но количество учеников изменилось на 7, и поэтому оно не могло остаться кратным 9.

б) Да. Допустим, что в школе было 3 класса с семью мальчиками и двумя девочками и 4 класса с семью девочками и двумя мальчиками. Добавляя в первые три класса по девочке, а в остальные по мальчику, получаем требуемое разбиение.

в) Аналогично п. а) получаем, что количество детей в школе кратно 10. Обозначим это количество через $10k$ и запишем k в виде $k = 9a + b$, где b — остаток от деления k на 9. Тогда $10 \cdot (9a + b) - 7$ (старое число учеников) должно быть кратно 9, а значит, $10b - 7$ кратно 9, следовательно, $b = 7$.

Поэтому в школе $10(9a + 7) = 90a + 70$ учеников, значит, в неполной группе будет 70 человек.

16. Выступление спортсмена оценивают несколько судей, каждый судья выставляет оценку — целое число баллов от 0 включительно до 10 включительно. Известно, что каждому спортсмену все судьи выставили различные оценки.

Результат спортсмена — среднее геометрическое оценок судей. Оказалось, что все спортсмены получили различные целые оценки.

а) Могло ли быть 2 судьи и 6 спортсменов?

б) Могло ли быть 3 судьи и 5 спортсменов?

в) При каком наибольшем количестве судей описанная ситуация возможна для двух спортсменов (приведите соответствующий пример и докажете, что большее число получиться не могло)?

Ответ. а) Нет; б) да; в) 4.

Решение. а) Нет. Можно сделать произведение двух различных целых чисел из промежутка $[0; 10]$ равным 0, 4, 9, 16, 36. Никакие другие произведения, дающие квадрат целого числа, невозможны.

б) Да. Допустим, судьи выставили такие наборы оценок: $(0, 1, 2)$, $(1, 2, 4)$, $(2, 4, 8)$, $(1, 3, 9)$, $(4, 6, 9)$. Тогда условие задачи выполняется.

в) Для четырех судей возможны наборы $(0, 1, 2, 3)$ и $(3, 6, 8, 9)$.

Если судей хотя бы 5, то описанная ситуация невозможна. В самом деле, только один спортсмен мог получить 0. Допустим, другой спортсмен получил a . Тогда число $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10$ делится на a^5 , следовательно, $a = 1$ или $a = 2$. Очевидно, представить число 1 в виде произведения нескольких различных целых чисел или число 32, 64 или 128 в виде произведения 5, 6 или 7 различных целых чисел из промежутка $[1; 10]$ невозможно.

Будем надеяться, что тренажер поможет вам лучше овладеть навыками решения задач. Удачи на экзамене!

Ответы, указания, решения

§1. Делимость и её свойства. Признаки делимости

Диагностическая работа 1

1. 1, 4 или 7. 2. Да. 3. 3. 4. Нет.

1.1. Свойства делимости

Подготовительные задачи

1. Нет (например, 12). 2. Нет. 3. Да. 4. Нет (например, $a = 2$).
5. *Указание.* Выделите из искомого выражения слагаемые, которые заведомо делятся на 3.
6. 1. 7. 1. 8. 1; 3. 9. 1.
10. *Указание.* Рассмотрите по отдельности делимость на 2, на 3 и на 5.
11. Например, 1; 2; 3; 6; 12. *Указание.* Попробуйте придумать два таких числа, затем к ним подберите третье и т. д.

Основные задачи

1. *Указание.* Умножьте числитель дроби на 5, знаменатель — на 3 и вычтите одно из другого.
2. *Указание.* Разложите выражение на множители и рассмотрите по отдельности делимость на 3 и на 8.
3. *Указание.* Рассмотрите два случая чётности n , в случае нечётного рассмотрите делимость на среднее число данной последовательности, а в случае чётного — делимость на сумму двух чисел, стоящих в середине последовательности.
4. 133. 5. 251.

1.2. Признаки делимости

Подготовительные задачи

1. а) 99 832 476 252; б) 99 832 476 252; 2012; в) 79 255; г) 99 832 476 252; д) нет таких чисел; е) нет таких чисел; ж) 79 255.
2. *Указание.* Рассмотрите варианты чётности данных чисел.
3. *Указание.* Рассмотрите варианты чётности данных чисел.
4. **Решение.** Так как итоговое произведение нечётно, все сомножители тоже нечётны. Значит, и сумма, и произведение исходных чисел нечётны, чего быть не может.
5. 4. *Указание.* Вычислите сумму цифр в этом числе.

6. 1155; 4155; 7155; 3150; 6150; 9150. *Указание.* Рассмотрите сначала делимость на 5, а затем — на 3.

7. 4104. *Указание.* Рассмотрите сначала делимость на 8, а затем — на 9.

8. *Указание.* Посчитайте сумму всех сумм цифр данных чисел, для этого посчитайте количество всех составленных чисел.

9. 987654320. *Указание.* Делимость на 9 следует из делимости суммы цифр на 9, а чтобы была делимость на 4, число из двух наименьших цифр, удовлетворяющее этому условию, ставится в конец искомого числа.

10. Нет. *Указание.* Сумма цифр на чётных местах не может быть равна сумме цифр на нечётных местах (так как сумма всех цифр нечётна). Но отличаться на 11 и больше они тоже не могут (рассмотрите наименьшую и наибольшую возможные суммы).

11. *Указание.* Левая часть не делится на 11, а правая делится.

Основные задачи

1. 523 152; 523 656. *Указание.* Искомое число должно делиться на 504.

2. Нет. *Указание.* Рассмотрите чётность суммы чисел в каждой группе и чётность суммы всех чисел от 1 до 21.

3. Нет. *Указание.* Использовано 10 букв, значит, одна из них обозначает цифру 0. Раз произведения равны, то эта буква повторяется в обоих словах. Значит, это Л, М или О. Л и М быть не могут, так как с них начинаются числа. Значит, О равно нулю, а тогда число МИХАЙЛО чётно.

4. 8910. *Указание.* Это число должно делиться на 990, а такие числа можно перебрать.

5. 9. *Указание.* По признаку равноостаточности (задача 1 подготовительных задач параграфа 3) разность этих чисел делится на 9, значит, меньше 9 единиц быть не может. Для 9 единиц годится такой пример: $9\ 087\ 654\ 321 - 8\ 976\ 543\ 210 = 111\ 111\ 111$.

6. а) Да; б) да; в) нет. *Указание.* В первых двух пунктах нетрудно подобрать сумму цифр на чётных и на нечётных местах так, чтобы они отличались на 11 в п. а) и на 22 в п. б). Останется подобрать числа, например, так: а) 9 783 625 401 и б) 305 162 847 (всевозможные перестановки цифр, стоящих на местах одной чётности, дадут гораздо больше, чем 11 вариантов). В п. в) сумма всех цифр нечётна, значит, разность между суммами цифр на чётных и на нечётных местах должна быть равна 11, что невозможно.

7. 987 652 413. *Указание.* Найдите, чему могут быть равны суммы цифр на чётных и нечётных местах, после чего включите в сумму на

нечётных местах самые большие нечётные цифры: 9; 7; 5, а в сумму на чётных — самые большие чётные: 8; 6.

8. 45; 54. *Указание.* 2430 делится на 5 и на 81. Значит, исходное число делится на 9 и имеет в своей записи цифру 5.

9. Нет. *Указание.* Если сложить десять нечётных чисел, то сумма будет чётной.

10. *Указание.* Исходное число чётное, значит, его квадрат должен делиться на 4.

11. 2. *Указание.* Сумма всех чисел равна $37 \cdot 19$, а она должна делиться на последнее число, значит, последнее число равно 19, а тогда третье может быть равно только 2.

§ 2. Остатки

Диагностическая работа 2

1. $2012 = 154 \cdot 13 + 10$. 2. 0. 3. 3.
4. Делитель равен 3, остаток 2. 5. 21; 26; 31; 36.

Подготовительные задачи

1. а) 2; б) 0; в) 2; г) 3; д) 5. 2. а) 0; б) 0; в) 3; г) 2; д) 6.

3. 1. 4. а) 6; б) 9; в) 5.

5. *Указание.* Рассмотрите все варианты остатков исходного числа при делении на 4.

6. *Указание.* Рассмотрите все варианты остатков исходного числа при делении на 5.

7. *Указание.* Разложите исходное число на множители и рассмотрите остатки при делении на 3.

8. а) 0; 1; 6; б) 0; 1; 8.

9. *Указание.* Воспользуйтесь результатом предыдущего примера.

10. *Указание.* Рассмотрите остаток данного числа при делении на 9.

11. *Указание.* В п. а) рассмотрите остатки, которые квадраты могут давать при делении на 3, в п. б) рассмотрите остатки, которые квадраты могут давать при делении на 4, в п. в) рассмотрите остатки, которые квадраты могут давать при делении на 5.

12. *Указание.* Приведите выражение к общему знаменателю и покажите, что числитель делится на 3 и на 5 (рассмотрев остатки).

Основные задачи

1. 1946. *Указание.* Докажите, что неполные частные в обоих случаях будут одинаковыми.

2. *Указание.* Замените 2222 и 5555 на их остатки при делении на 7.

3. **Указание.** Рассмотрите остаток данного выражения при делении на 7 и используйте то, что шестая степень при делении на 7 даёт только остатки 0 и 1.

4. 959. **Указание.** Если к искомому числу прибавить 1, то оно будет делиться на 3, на 4 и на 5.

5. 2,5.

6. **Решение.** Если в десятизначном числе все цифры различны, то сумма всех цифр равна 45, а тогда оно делится на 3. Значит, искомый квадрат даёт остаток 2 при делении на 3, чего быть не может.

7. **Указание.** Исходное число даёт остаток 1 при делении на 9 и на 11. Сумма цифр не может быть равна 1, значит, надо доказать, что она не равна 10. Рассмотрите разность между суммой цифр на чётных и на нечётных местах и оцените её.

8. 0. **Указание.** В каждом десятке сумма чисел будет оканчиваться на одну и ту же цифру.

9. **Указание.** Замените числа вида $n - k$ на сравнимые с ними числа $-k$.

10. **Указание.** Докажите, что это произведение делится на 3, на 4 и на 5.

11. 199400. **Указание.** Рассмотрите формулы деления с остатком на 100 и на 1995, после чего приравняйте их правые части и используйте равенство из условия.

12. 28572. **Указание.** Рассмотрите периодичность остатков чисел вида 2^n и n^2 при делении на 7.

13. (52; 34) и (34; 52). **Указание.** Оцените число q , после чего преобразуйте запись деления $a^2 + b^2$ на $a + b$ с остатком, выделите полные квадраты и рассмотрите, какие последние цифры могут быть у этих квадратов.

14. **Указание.** Рассмотрите остатки чисел вида 2^n при делении на 5 и на 13.

15. **Указание.** Рассмотрите остатки при делении на 3 и на 8.

16. **Указание.** Обозначьте $2^n - 2 = nm$, после чего воспользуйтесь формулой для разности одинаковых степеней.

17. **Указание.** Сначала докажите утверждение для простых n , после чего докажите, что если оно верно для $n = a$ и для $n = b$, то оно верно и для $n = ab$.

18. **Решение.** Разность между любыми двумя составленными числами делится на 9, а значит, если одно из них делится на второе, то их разность также делится на второе, причём частное должно делиться на 9 (так как оба исходных числа на 9 не делятся), а оно не превышает 7 — противоречие.

§ 3. Десятичная запись числа

Диагностическая работа 3

1. 214 страниц. 2. 18 лет.
3. 105 263 157 894 736 842. Этот ответ не единственный. Можно к указанному числу приписать такое же несколько раз.
4. Нет.

Подготовительные задачи

1. *Указание.* Используйте разложение числа по степеням числа 10 и заметьте, что любая степень числа 10 даёт остаток 1 при делении на 9.

2. 37. *Решение.* Сократив обе части равенства $\overline{ab} \cdot a \cdot b = \overline{bbb}$ на b , получим равенство $\overline{ab} \cdot a = 111$. Из разложения числа 111 на простые множители имеем $\overline{ab} = 37$.

3. а) 911 121 314 151 617 181 920; б) 101 111 314 151 617 181 920.

Указание. При равном количестве цифр больше то число, у которого больше цифра в старшем разряде.

4. 72. *Указание.* Разложите 1008 (половина от 2016) на множители.

5. 142857. *Указание.* Преобразуйте равенство к виду

$$a_n \cdot \overline{99\dots95} = 49a_1\dots a_n$$

и заметьте, что тогда $\overline{99\dots95}$ делится на 7, что возможно, если девяток не менее 4 ($n = 6$).

6. *Указание.* Используйте признак делимости на 16.

7. 69.

Основные задачи

1. *Указание.* Представьте оба числа в десятичной форме и упростите разность.

2. *Указание.* Представьте число в десятичной форме и воспользуйтесь формулой для квадрата суммы.

3. *Указание.* Полученная сумма будет делиться на 111, а $111 = 37 \cdot 3$.

4. 89. *Решение.* $\overline{ab} = a + b^2$, $9a = b(b - 1)$. Следовательно, $b = 9$, а тогда $a = 8$.

5. 251. *Указание.* Оцените разность между данной дробью и $\frac{1}{2}$ сверху и снизу.

6. Да. Например, 111...1599125. *Указание.* Подберите число, оканчивающееся на 125, чтобы сумма его цифр была равна 125.

7. Нет. *Решение.* Имеем $2010 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67$, а простое число 67 нельзя представить в виде произведения цифр.

8. *Указание.* Представьте число в десятичной форме.

9. 700; 707; 770; 777. *Указание.* Докажите, что все цифры этого числа дают одинаковый остаток при делении на 7.

10. 25; 76. *Указание.* Представьте число в десятичной форме или воспользуйтесь умножением в столбик.

11. 376; 625. *Указание.* Представьте число в десятичной форме или воспользуйтесь умножением в столбик.

12. Такое двузначное число единственно, это 81. Трёхзначных чисел с таким свойством не существует. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа, чтобы составить уравнение.

13. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа и поменяйте местами цифры a_k и a_{k+1} .

14. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа и поменяйте местами цифры a_{k-1} и a_{k+1} .

15. *Указание.* Представьте число в десятичной форме и воспользуйтесь формулой для квадрата суммы.

16. 100. **Решение.** Заметим, что для трёхзначного числа \overline{abc} выполняется неравенство $\overline{abc} \leq 100(a + b + c)$, причём равенство достигается при $b = c = 0$.

17. 1811. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа и сформулируйте ограничения на все цифры начиная с первой.

18. 7; 8; 9. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа.

19. 101 цифра. *Указание.* Оцените отдельно степень двойки и степень пятёрки искомыми степенями числа 10, после чего перемножьте полученные двойные неравенства и решите систему.

20. 3. *Указание.* Оцените отдельно степень двойки и степень пятёрки искомыми степенями числа 10, после чего перемножьте полученные двойные неравенства.

21. 987654312.

22. 7. **Решение.** Заметим, что

$$\frac{1}{7} = 0,142\dots,$$

а у дробей с меньшим знаменателем такое сочетание не встречается, так как такие дроби будут либо конечными (знаменатели 1, 2, 4, 5) и не содержащими такого сочетания, либо чисто периодическими с периодом в одну цифру (знаменатель 3), либо периодическими с периодом в одну цифру и предпериодом в одну цифру (знаменатель 6). Такое суждение справедливо для дробей с произвольным числителем.

23. а) 2 числа; б) 1 и 4. *Указание.* Воспользуйтесь тем, что несократимая правильная дробь представляется в виде конечной десятичной дроби в том и только в том случае, когда её знаменатель не делится на простые числа, отличные от 2 и 5.

24. *Указание.* Обозначьте дробь через x и домножьте её на 10 в степени, равной количеству цифр в периоде.

25. Да. *Указание.* Числа, отличающиеся перестановкой цифр, дают одинаковые остатки при делении на 9.

26. 7. *Указание.* Рассмотрите остаток числа при делении на 9.

27. 7. *Указание.* Рассмотрите остаток числа при делении на 9 и оцените количество цифр в числе.

28. 143; 143. *Указание.* Если обозначить искомые трёхзначные числа через x и y , то шестизначное число будет равно $1000x + y$.

29. 9; 11; 25. *Указание.* Оцените сумму трёх чисел, после чего сделайте перебор вариантов.

30. а) 1667; 3334; б) 16 667; 33 334. *Указание.* Если x и y — искомые трёхзначные числа, то полученное число будет равно $10\,000x + y$ в п. а) и $100\,000x + y$ в п. б).

31. 180 625. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа.

32. 2178. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа.

33. 17; 34. *Указание.* Воспользуйтесь десятичной записью числа.

34. 6; 2; 9. *Указание.* Рассмотрите разность данных чисел и докажите, что она будет делиться на 37, а следовательно, исходное трёхзначное число также должно делиться на 37.

35. 7744. *Указание.* Искомое число делится на 11, значит, будучи точным квадратом, оно делится на 121.

36. 29; 38; 47; 56; 65; 74; 83; 92. *Указание.* Докажите, что сумма цифр числа должна делиться на 11.

37. $\frac{1}{37}$. *Указание.* Это значение достигается при $a = 73$, $b = 37$. Докажите, что меньше модуль разности быть не может.

38. (12; 8) или (23; 9). *Указание.* Обозначьте через k количество цифр в числе b и запишите уравнение, заданное условием.

39. (1; 2). *Указание.* Оцените число b степенями числа 10, а затем оцените b^2 и ab^2 .

40. 183; 328; 528; 715; 999.

§ 4. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Основная теорема арифметики и её следствия

Диагностическая работа 4

1. НОД равен 2, НОК равно $2^3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 67$. 2. 43.

3. 30 и 210 или 90 и 150. **Решение.** Разделив каждое из чисел на их наибольший общий делитель, получим два натуральных взаимно

простых числа, сумма которых равна $240 : 30 = 8$. Число 8 можно разбить в сумму двух взаимно простых натуральных слагаемых двумя способами: $8 = 1 + 7$ или $8 = 3 + 5$. Таким образом, исходные числа могут быть равны 30 и 210 или 90 и 150.

4. 2011!. **Решение.** Имеем

$$2009! + 2010! = 2009! \cdot (1 + 2010) = 2009! \cdot 2011.$$

Так как $2011! : (2009! \cdot 2011) = 2010$, наименьшим числом, кратным обоим этим числам, будет число 2011!.

5. 133. **Решение.** Простыми делителями числа 1000 являются лишь 2 и 5. Значит, данные в условии задачи два числа могут содержать в своём разложении на простые сомножители только 2 и 5. При этом если в каком-то из этих чисел среди простых сомножителей окажутся и 2, и 5, то такое число будет кратно 10 вопреки условию. Значит, одно из данных чисел имеет своими простыми сомножителями только 2, а другое — только 5. Тогда одно из чисел равно 8, а другое — 125.

4.1. НОД и НОК

Подготовительные задачи

1. 24. 2. 1. 3. 96. 4. 787878. 5. 36. 6. 8044. 7. 600.

8. 32. **Указание.** Рассмотрите 2 случая: когда одно из чисел равно 2000 и когда они оба отличны от 2000.

9. $\frac{700}{33}$. **Решение.** Числитель дроби должен быть равен

$$\text{НОК}(35, 28, 25) = 700,$$

а знаменатель — $\text{НОД}(66, 165, 231) = 33$.

10. На 7 при $n = 7k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$. **Указание.** Используйте алгоритм Евклида для нахождения НОД.

11. 1; 3.

12. Например, 10 и 15. **Указание.** Придумайте такие два числа, сумма которых равна квадрату их НОД.

Основные задачи

1. 1; 2.

2. 13 и 52. **Указание.** Используйте то, что оба этих числа делятся на 13 и являются делителями числа 52.

3. (252; 36) или (180; 108). **Указание.** Если $\text{НОД}(n, k) = 36$, то $k = 36x$, $n = 36y$.

4. (115; 552) или (232; 435). 5. $\frac{53}{93}$; $\frac{56}{96}$. 6. $\frac{19}{7}$.

7. 2; 6. **Указание.** Обозначьте $\text{НОД}(x, y) = a$ и докажите с помощью свойств делимости, что 6 делится на a .

8. 9. *Указание.* На 9 они все делятся, а разность между 123 456 789 и 123 456 798 равна 9, так что больше 9 НОД быть не может.

9. 1111. *Указание.* Разделите большее число на меньшее с остатком.

10. На 3 при $n = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$. *Указание.* Используйте алгоритм Евклида для нахождения НОД.

11. *Указание.* Используйте алгоритм Евклида для нахождения НОД.

12. 21. *Указание.* Пусть $f(n) = 4^{n+2} + 5^{2n+1}$. Рассмотрите разность $f(n+1) - 4f(n)$. Она также должна делиться на искомый НОД.

13. 36. *Указание.* Это возможно тогда и только тогда, когда $n + 1$ взаимно просто с каждым из чисел 2, 3, ..., 31.

14. 108 или 504. *Указание.* Рассмотрите степени двойки, тройки и пятёрки, входящие в искомый НОД.

15. 1, 2, 3, 4, 6. *Указание.* Сначала покажите, что любое число, большее 6, представимо в таком виде. Рассмотрите случаи различной чётности числа.

16. а) $\text{НОД}(m, n) + 1$; б) $m + n - \text{НОД}(m, n)$. *Указание.* Решите задачу для взаимно простых измерений, после чего сведите к ней исходную.

17. $\frac{R}{\text{НОД}(R, r)}$ отметок, $\frac{r}{\text{НОД}(R, r)}$ оборотов. *Указание.* Вычислите путь, который проедет колесо до момента, когда гвоздь вновь попадёт в отмеченную точку.

18. 183 (достигается, когда девять чисел равны 183, а одно — 366). *Указание.* Рассмотрите делители числа 2013.

4.2. Основная теорема арифметики. Делители

Подготовительные задачи

1. $3 \cdot 37$; $11 \cdot 101$; $41 \cdot 271$; $3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$; $239 \cdot 4649$.

2. 133. *Указание.* Одно из них — степень пятёрки, а другое — степень двойки.

3. Да, нет, нет. *Указание.* Разложите эти числа на простые множители и проверьте, будут ли все сомножители меньше 10.

4. а) 3; б) 18; в) $\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{4}\right] + \left[\frac{n}{8}\right] + \dots + \left[\frac{n}{2^k}\right]$. *Указание.* Найдите количество чисел, делящихся на 2, количество чисел делящихся на 4, и т. д.

5. *Указание.* Воспользуйтесь каноническим разложением числа.

6. *Указание.* Число 2 входит в него в нечётной степени (1).

7. а) 4; б) 6; в) 12; г) 20; д) $(n+1)(3n+1)$. *Указание.* Воспользуйтесь формулой для количества делителей.

8. а) 18; б) 36; в) 1092; г) 4836. *Указание.* Воспользуйтесь формулой для суммы делителей.

Основные задачи

1. 6; 10; 14; 30; 42; 70; 105; 210. *Указание.* $1920 = 2^7 \cdot 3 \cdot 5$. Выпишите все делители числа 210 (их всего 16), из них 8 делятся на 2, а нужно выбрать как минимум 7. Рассмотрите случаи, когда выбрано число 2 (в этом случае все остальные числа должны быть чётными) и когда число 2 не выбрано.

2. 123. *Указание.* Вычислите степень вхождения чисел 2 и 17 в разложение числа 1999!

3. *Указание.* 2^{n-1} — это число способов разбить множество из n простых сомножителей на 2 подмножества.

4. На девятую. *Решение.* Разложим число 2007 на простые множители: $2007 = 3^2 \cdot 223$. В разложении на простые множители числа 2007! показатель степени у числа 3 будет достаточно большим, так как множитель 3 входит в разложение каждого третьего числа. Множитель 223 входит только в разложение чисел вида $223p$, где p — натуральное число, не превосходящее 9. Таким образом, в разложение числа 2007! на простые множители число 223 войдёт с показателем 9. Следовательно, число 2007! будет делиться на 2007^9 , но не будет делиться на 1007^{10} .

5. $2^{15} \cdot 3^{10} \cdot 5^6$.

Указание. Половина искомого числа имеет все чётные степени в каноническом разложении, треть — делящиеся на 3, а пятая часть — делящиеся на 5. А в разложение этого числа входят как минимум степени чисел 2, 3 и 5.

6. $2 \cdot 3^2 \cdot 7^6$; $2 \cdot 3^6 \cdot 7^2$; $2^2 \cdot 3 \cdot 7^6$; $2^2 \cdot 3^6 \cdot 7$; $2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$; $2^6 \cdot 3 \cdot 7^2$.

Указание. В разложении этого числа есть делители 2, 3 и 7, а других простых делителей искомого числа не имеет, так как 42 нельзя разложить в произведение более чем трёх натуральных сомножителей, больших 1.

§ 5. Уравнения в целых числах

Диагностическая работа 5

1. (11, 0), (−13, −2). 2. (1, 1). 3. (3, 2).

4. (1, 2), (1, ±3). 5. (−1, 0), (0, 0).

Подготовительные задачи

1. (3; 2). *Указание.* Используйте формулу разности квадратов.

2. 3; 4; 5. 3. *Указание.* 7 — нечётное число.

4. $(2; 2)$, $(0; 0)$. *Указание.* Перенесите все слагаемые в одну часть, после чего добавьте в каждую часть по 1 и разложите получившееся выражение на множители.

5. $(-5; -2)$, $(-3; 2)$, $(3; -2)$, $(5; 2)$. *Указание.* Число 7 можно представить в виде произведения целых чисел лишь двумя способами (без учёта перестановки чисел).

6. $(-14; -3)$, $(-14; 3)$, $(-3; -14)$, $(-3; 14)$, $(3; -14)$, $(3; 14)$, $(14; -3)$, $(14; 3)$. *Указание.* Прибавьте к каждой части по 1 и разложите левую часть на множители.

7. $(2, 2, 1)$. *Указание.* Дробь в левой части строго меньше 1, следовательно, $x = 2$.

8. $(3; 5)$, $(5; 3)$. *Указание.* Добавьте в каждую часть по 1 и разложите левую часть на множители.

9. Решений нет. *Указание.* Выделите в левой части полный квадрат и рассмотрите остатки при делении на 3.

Основные задачи

1. $(239; 239 \cdot 240)$, $(478; 478)$, $(239 \cdot 240; 239)$. *Указание.* Домножьте уравнение на знаменатели.

2. $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 0)$, $(1; 2)$, $(2; 1)$, $(2; 2)$. *Указание.* Заметим, что

$$x^2 - xy + y^2 = (x + y)^2 - 3xy.$$

Так как $xy \leq \frac{(x + y)^2}{4}$, получаем

$$(x + y)^2 - 3xy \geq (x + y)^2 - 3 \cdot \frac{(x + y)^2}{4} = \frac{(x + y)^2}{4}.$$

Таким образом, $x + y \geq \frac{(x + y)^2}{4}$, откуда $0 \leq x + y \leq 4$. Подставляя в исходное уравнение возможные значения $x + y$, получаем значения x, y , а затем находим значения переменных.

3. $(-1; -1)$, $(0; -1)$, $(-1; 0)$, $(0; 0)$. *Указание.* Добавьте в каждую часть по 1 и выделите полный квадрат в правой части.

4. $(-4; -3)$, $(-4; 3)$, $(1; -3)$, $(1; 3)$. *Указание.* Возможны два пути решения: либо показать, что при достаточно больших по модулю x выражение $x^2 + 3x + 5$ находится между двумя последовательными квадратами, либо домножить обе части на 4 и, выделив полный квадрат, разложить на множители.

5. Нет решений. *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 5.

6. $(0; 0)$. *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 3.

7. $(2; 8)$, $(6; 28)$.

8. Нет решений. *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 3.

9. Нет решений. *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 4.
10. Нет решений. *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 4.
11. Нет решений. *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 5.
12. (1; 3). *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 3 и на 4.
13. (1; 2), (2; 1), (k; k), где $k \in \mathbb{Z}$. *Указание.* Используйте разложение на множители.
14. (11; 5). *Указание.* Так как $2^y < 2^x$, наибольшая степень двойки, на которую делится левая часть, равна y . А $2016 = 32 \cdot 63$. Следовательно, $y = 5$.
15. (0; 0), (1; 2). *Указание.* Разложите на множители левую часть и рассмотрите остатки при делении на 4.
16. (2; 1). *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 3 или на 4.
17. (4; 6). *Указание.* Рассмотрите остатки при делении на 5.
18. (0; 3), (2; 4). *Указание.* Из уравнения следует, что $2^y > 7$, т. е. $y \geq 3$. Значит, $x \geq 0$. Если $x = 0$, то $y = 3$. При $x \geq 1$ рассмотрите остатки при делении на 3 и на 4 и докажите, что обе переменные чётные. Дальше задача решается разложением на множители.
19. (2; 4), (4; 2). *Указание.* Одно из возможных решений этой задачи — прологарифмировать уравнение по основанию e и исследовать функцию $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ на монотонность.

§ 6. Неравенства и оценки в задачах теории чисел

Диагностическая работа 6

1. 1. 3. 1999. 5. 18.

6.1. Среднее арифметическое. Неравенство о средних

Подготовительные задачи

- Указание.* Сведите неравенство к формуле квадрата разности.
- Указание.* Домножьте неравенство на знаменатель и перенесите все в одну часть.
- Указание.* Примените два раза неравенство о средних для двух чисел.
- Указание.* Домножьте исходное неравенство на все знаменатели и упростите получившееся неравенство.
- Указание.* Примените неравенство о средних для каждой из скобок.
- Указание.* Примените неравенство о средних для трёх чисел.
- 8.

8. Нет. *Указание.* Воспользуйтесь определением среднего арифметического и докажите, что в этом случае сумма десяти чисел будет нецелой.

9. 1,22 м. 10. 32. 11. 70.

12. *Указание.* Примените неравенство о средних для n чисел.

Основные задачи

1. *Указание.* Домножьте обе части на 2. Разбейте левую часть в сумму 6 слагаемых и трижды воспользуйтесь неравенством о средних для двух чисел.

2. *Указание.* Домножьте обе части на 2. Разбейте левую часть в сумму 6 слагаемых и трижды воспользуйтесь неравенством о средних для двух чисел.

3. *Указание.* Запишите $3x^3 = 2x^3 + x^3$ и примените неравенство о средних для трёх чисел.

4. От 15 до 55 включительно.

5. *Указание.* Рассмотрите максимальное из всех чисел. Докажите, что все соседние с ним числа равны ему. Их соседи — тоже и т. д.

6. *Указание.* Обозначьте среднее арифметическое данных чисел через новую переменную, а в качестве второй переменной введите разность между большим числом и средним арифметическим, после чего докажите, что произведение чисел будет максимальным, когда введённая разность равна нулю.

7. 4.

8. 96 433 469. *Указание.* В искомом числе разница между цифрой и следующей за ней убывает. Отсюда и из того, что все цифры не больше 9, следует, что цифр в искомом числе не более 8. Следовательно, осталось подобрать восьмизначное число, причём набор разностей должен быть таким: 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3.

9. а) 44; б) отрицательных; в) 17. *Указание.* Обозначьте через три переменные количество положительных чисел, количество отрицательных и количество нулей в нашем наборе, после чего воспользуйтесь определением среднего арифметического.

6.2. Неравенства и оценки

Подготовительные задачи

1. (1; 2), (2; 1), (1; 1).

2. (0; 0), (1; 0), (-1; 0), (-1; 1), (0; 1), (1; 1), (-1; 2), (0; 2), (1; 2).

Указание. Ограничьте множество возможных значений y .

3. 3^{200} . *Указание.* Представьте оба выражения как сотые степени.

4. 3^{28} . Представьте оба выражения как четвёртые степени.

5. 4^{200} . *Указание.* Воспользуйтесь неравенством $4^{100} + 4^{100} < 4^{200}$.
6. 1234568^2 . *Указание.* Воспользуйтесь формулой разности квадратов.
7. 51^{101} . *Указание.* Воспользуйтесь формулой разности квадратов 50 раз.
8. *Указание.* Если $n > 2$, то $n^2 = n \cdot n > 2n$.
9. -1 ; 3. *Указание.* Оцените x сверху исходя из области определения корня и снизу из условия, что правая часть должна быть неотрицательной.
10. -3 .

Основные задачи

1. *Указание.* Докажите, что $26^{15} < 10^{23}$. Для этого, например, воспользуйтесь оценкой $26^2 < 10^3$.
2. 31. *Указание.* Докажите, что $2^{100} > 10^{30}$, а затем — что $2^{100} < 10^{31}$. Для доказательства второго неравенства можно воспользоваться оценкой $5^7 > 2^{16}$.
3. 17^{14} . *Указание.* Докажите, что $32^{11} < 16^{14}$.
4. 8^{85} . *Указание.* Представьте 8^{85} как степень двойки, после чего каждое из трёх неравенств докажется с помощью сокращения показателей и базовых оценок: $2^5 > 5^2$, $2^5 > 3^3$, $2^{17} > 7^6$.
5. *Указание.* Первые четыре слагаемых данной алгебраической суммы уже больше $\frac{1}{5}$.
6. $-\frac{47}{3}$. *Указание.* Воспользуйтесь тем, что $\frac{3x+41}{3}$ — целое число, обозначьте это целое число через новую переменную, выразите через неё x и подставьте результат в выражение $\frac{2x+17}{10}$.
7. $-\frac{1}{4}$; 0 ; $\frac{7}{2}$. *Указание.* Если $[n] < 0$, то $2^{[n]} \in (0; 1)$, а значит, и $2n+1 \in (0; 1)$, из чего следует, что $n \in (-\frac{1}{2}; 0)$. Тогда $[n] = -1$, откуда легко найти n . Если же $[n] \geq 4$, то решений нет, так как левая часть больше правой. Остальные случаи нетрудно перебрать.
8. 1, 2, ..., 2008. *Указание.* Докажите, что

$$2008 \cdot 1004 < 2008 \sqrt{1004^2 + 1} < 2008 \cdot 1004 + 1,$$

откуда будет следовать, что

$$[2008 \sqrt{1004^2 + 1}] = 2008 \cdot 1004.$$

9. $(-7; 7)$, $(-6; 6)$. *Указание.* Поделите первое неравенство на 2 и выделите в нём полные квадраты.

10. 24. *Указание.* Обозначьте через переменные производительность и время работы мастера, после чего составьте уравнение и выразите в нём производительность через время.

§ 7. Последовательности и прогрессии

Диагностическая работа 7

1. 50. 2. 11. 3. 54850. 4. $\frac{4}{3}$. 5. 931.

Подготовительные задачи

1. -25 ; -115 .

2. 15. *Указание.* Воспользуйтесь характеристическим свойством арифметической прогрессии.

3. 0. 4. 2.

5. 1024. *Указание.* Воспользуйтесь характеристическим свойством геометрической прогрессии.

6. 6; 10. *Указание.* Произведение четырнадцатого и второго членов геометрической прогрессии равно произведению её шестого и десятого членов.

7. 25. *Указание.* Произведение шестого и восьмого членов геометрической прогрессии равно произведению её пятого и девятого членов.

8. 420. *Указание.* Найдите первый отрицательный член данной прогрессии.

9. 64. *Указание.* Воспользуйтесь неравенством о средних для трёх чисел.

10. Нет. *Указание.* Если цифры образуют арифметическую прогрессию, то их сумма делится на 3.

Основные задачи

1. 1; 3267. *Указание.* Докажите, что эта сумма всегда нечётна.

2. Нет. *Указание.* Отношение между разностью двух членов арифметической прогрессии и разностью других двух её членов должно быть рациональным.

3. $\left(\frac{85}{18}; 5\right)$.

4. -8 . *Указание.* Выразите все указанные члены прогрессии как функцию от разности прогрессии.

5. 8. 6. 4. 7. ± 400 .

8. 1, 3, 5, 7, ... *Указание.* S_n является квадратичной функцией от n , а для функции $f(n) = an^2 + bn + c$ свойство $f(n) \cdot f(m) = f(mn)$ выполняется только при $a = 1$, $b = c = 0$.

10. 1; 4; 7 или 7; 4; 1. 11. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 12. 3; 15; 27.

13. 3; 13; 23. *Указание.* Как минимум одно из этих чисел должно делиться на 3.

14. (2; 3), (3; 5; 7). *Указание.* Если чисел не менее трёх, то как минимум одно из них делится на 3.

15. $b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$. 16. Неверно. (Пример: $a_n = 2^{\frac{n-1}{9}}$.) 17. $6^6 + 61$.

18. -6. *Указание.* Докажите, что каждое число не превосходит 0,5.

19. а) Нет; б) может, например, {11·97; 97; 11·97}; в) 371. *Указание.* а) Рассмотрите чётность суммы этих двух членов. в) Минимально возможный вариант — когда чередуются числа 1 и 11.

20. а) Нет; б) нет; в) да (например, 1, 2 и 4). *Указание.* а) Если 5 чисел образуют геометрическую прогрессию, то их произведение равно пятой степени среднего члена прогрессии. б) В этом случае если первый член искомой прогрессии равен b_1 а знаменатель — q , то произведение четырёх членов прогрессии равно $b_1^4 q^6$. Дальнейший краткий перебор результатов не даст.

Содержание

| | |
|--|----|
| Предисловие | 3 |
| Диагностическая работа | 4 |
| Решения задач диагностической работы | 5 |
| § 1. Делимость и её свойства. Признаки делимости | 9 |
| Диагностическая работа 1 | 9 |
| Краткая теоретическая справка | 9 |
| 1.1. Свойства делимости | 10 |
| Примеры решения задач | 10 |
| Подготовительные задачи | 12 |
| Основные задачи | 12 |
| 1.2. Признаки делимости | 13 |
| Примеры решения задач | 13 |
| Подготовительные задачи | 15 |
| Основные задачи | 15 |
| § 2. Остатки | 17 |
| Диагностическая работа 2 | 17 |
| Краткая теоретическая справка | 17 |
| Примеры решения задач | 18 |
| Подготовительные задачи | 20 |
| Основные задачи | 21 |
| § 3. Десятичная запись числа | 23 |
| Диагностическая работа 3 | 23 |
| Краткая теоретическая справка | 23 |
| Примеры решения задач | 24 |
| Подготовительные задачи | 26 |
| Основные задачи | 27 |
| § 4. НОД и НОК. Основная теорема арифметики | 30 |
| Диагностическая работа 4 | 30 |
| Краткая теоретическая справка | 30 |
| 4.1. НОД и НОК | 32 |
| Примеры решения задач | 32 |
| Подготовительные задачи | 34 |
| Основные задачи | 35 |
| 4.2. Основная теорема арифметики. Делители | 36 |
| Примеры решения задач | 36 |

| | |
|--|-----|
| Подготовительные задачи | 37 |
| Основные задачи | 38 |
| § 5. Уравнения в целых числах | 39 |
| Диагностическая работа 5 | 39 |
| Краткая теоретическая справка | 39 |
| Примеры решения задач | 40 |
| Подготовительные задачи | 42 |
| Основные задачи | 42 |
| § 6. Неравенства и оценки в задачах теории чисел | 44 |
| Диагностическая работа 6 | 44 |
| Краткая теоретическая справка | 44 |
| 6.1. Среднее арифметическое. Неравенство о средних | 45 |
| Примеры решения задач | 45 |
| Подготовительные задачи | 46 |
| Основные задачи | 47 |
| 6.2. Неравенства и оценки | 48 |
| Примеры решения задач | 48 |
| Подготовительные задачи | 48 |
| Основные задачи | 48 |
| § 7. Последовательности и прогрессии | 50 |
| Диагностическая работа 7 | 50 |
| Краткая теоретическая справка | 50 |
| Примеры решения задач | 51 |
| Подготовительные задачи | 54 |
| Основные задачи | 55 |
| § 8. Как решать задачу 19: задачи ЕГЭ прошлых лет | 57 |
| § 9. Тренажёр. Многопунктовые задачи | 103 |
| Ответы, указания, решения | 122 |

Учебно-методическое пособие

*Георгий Игоревич Вольфсон
Максим Яковлевич Пратусевич
Сергей Евгеньевич Рукшин
Константин Михайлович Столбов
Иван Валериевич Яценко*

ЕГЭ 2020. МАТЕМАТИКА. АРИФМЕТИКА И АЛГЕБРА.
Задача 19 (профильный уровень)

Под редакцией И. В. Яценко

Подписано в печать 17.09.2019 г. Формат 60 × 90 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печ. л. 9. Тираж 3000 экз. Заказ №

Издательство Московского центра
непрерывного математического образования.
119002, Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел. (499) 241-08-04.

Отпечатано в ООО «Типография „Миттель Пресс“».
г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс +7 (495) 619-08-30, 647-01-89. E-mail: mittelpress@mail.ru

Книги издательства МЦНМО можно приобрести в магазине «Математическая книга»,
Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел. (495) 745-80-31. E-mail: biblio@mccme.ru
